

ANALYSE SUR UN DEMI-ESPACE HYPERBOLIQUE ET POLY-HOMOGENÉITÉ LOCALE

O. BIQUEARD AND M. HERZLICH

INTRODUCTION

L'objectif de cet article est de donner une preuve de la polyhomogénéité des métriques d'Einstein asymptotiquement hyperboliques réelles ou complexes dans le cas local. Ces métriques, introduites par Fefferman et Graham dans le cas réel au milieu des années 80 [7], se sont révélées être des instruments essentiels d'étude de la géométrie conforme ou de la géométrie CR : une métrique asymptotiquement hyperbolique induit en effet sur son *bord à l'infini* une structure conforme ou CR. Réciproquement, des théorèmes d'existence de métriques d'Einstein asymptotiquement hyperboliques avec structure à l'infini fixée ont été donnés ces dernières années [1, 2, 11].

L'idée principale de la théorie est que l'équation d'Einstein rigidifie suffisamment la situation pour que les propriétés de la structure placée à l'infini se reflète fidèlement dans la géométrie de la métrique asymptotiquement hyperbolique. Un outil essentiel de cette correspondance est l'existence d'un développement en série de ces métriques d'Einstein au voisinage de l'infini d'un type particulier, dit *développement polyhomogène* (voir la section 7 pour une définition précise). Les premiers termes de ce développement sont en général *formellement déterminés* (c'est-à-dire calculables à partir d'un jet d'ordre fini de la structure à l'infini) et servent de briques de base pour la construction d'invariants conformes ou CR. Les termes suivants dépendent de la géométrie globale de g et sont donc *formellement indéterminés* mais les premiers d'entre eux jouent un rôle crucial dans nombre de questions analytiques (voir plus bas).

Dans le cas hyperbolique réel, nos résultats étendent ceux de Chruściel, Delay, Lee et Skinner [6] qui ont prouvé la polyhomogénéité dans le cas global, c'est-à-dire quand le bord à l'infini est une variété fermée (compacte sans bord), et de Helliwell [12] qui a donné une preuve de la polyhomogénéité dans le cas local en dimension paire. Les résultats nouveaux sont donc, d'une part le cas complexe, d'autre part le cas réel local en dimension impaire.

Notre premier résultat peut s'énoncer comme suit (pour un énoncé plus précis, le lecteur est invité à se référer au théorème 7.4).

Théorème 1. *Soit M^n une variété difféomorphe à une demi-boule dont l'intérieur est muni d'une métrique d'Einstein g , asymptotiquement hyperbolique et dont la métrique induite sur le bord à l'infini est lisse. Alors la*

métrie g possède un développement polyhomogène au voisinage de son bord à l'infini.

Comme conséquence intéressante, toute métrique d'Einstein asymptotiquement hyperbolique complexe satisfait les hypothèses de [5] et peut donc être choisie comme facteur d'un produit de variétés d'Einstein à déformer.

Une fois l'existence établie, la forme du développement polyhomogène a été précisée par Fefferman et Graham [7, 10, 8] dans le cas réel, alors que Seshadri [14] en a étudié les premiers termes dans le cas complexe. L'information essentielle est l'existence de coordonnées privilégiées au voisinage de l'infini, dans lesquelles le développement possède une structure particulière : un voisinage de l'infini est écrit comme $(A, +\infty) \times \partial M$, et cette décomposition peut être faite de sorte que les coordonnées soient géodésiques, c'est-à-dire de sorte que la métrique s'écrive comme un produit tordu

$$g = dr^2 + g_r,$$

où g_r est une famille de métriques sur ∂M . Dans le cas réel, le développement s'écrit, quand $r \rightarrow +\infty$,

$$g_r = e^{2r}(\gamma + \gamma_2 e^{-2r} + \dots + \gamma_{n-2} e^{-(n-2)r} + h r e^{-(n-1)r} + \gamma_{n-1} e^{-(n-1)r} + \dots)$$

où γ est une métrique sur le bord à l'infini, et $\gamma_2, \dots, \gamma_{n-2}$ et h sont des champs de formes quadratiques sur l'espace tangent du bord à l'infini formellement déterminés, c'est-à-dire calculables comme des polynômes en un jet d'ordre fini de γ et de son inverse. Le premier terme formellement indéterminé γ_{n-1} est également un champ de formes quadratiques sur le bord à l'infini, et il pilote la suite du développement au sens où sa valeur, jointe à celle de $\gamma, \dots, \gamma_{n-2}$ et h , détermine celle de tous les termes suivants. La métrique g est quasi-isométrique à son terme principal g_0 , donné par

$$g_0 = dr^2 + e^{2r}\gamma.$$

Dans le cas complexe, des coordonnées similaires existent : le terme principal est donné, quand $r \rightarrow +\infty$, par

$$g_0 = dr^2 + \frac{1}{4}e^{2r}\eta^2 + \frac{1}{4}e^r\gamma,$$

où η est une 1-forme de contact sur le bord et γ une métrique sur la distribution de contact, induite par une structure CR. Alors existe un développement similaire en les puissances de $e^{-r/2}$,

$$g = g_0 + g_1 e^{-r/2} + g_2 e^{-r} + \dots,$$

dans lequel le premier terme indéterminé [2] arrive à l'ordre $n = 2m$ (c'est-à-dire au terme d'ordre e^{-mr}). Seshadri [14] a mis en évidence deux termes logarithmiques possibles dans le développement, dont le plus élevé, correspondant au terme logarithmique de Lee-Melrose [13] pour une métrique de Kähler-Einstein, apparaît à l'ordre $n + 2$ (c'est-à-dire au terme d'ordre $e^{-(m+1)r}$).

Une application de ces résultats est un résultat de continuation unique pour les métriques d'Einstein asymptotiquement hyperbolique réelles ou complexes.

Théorème 2. *Soit M^n une variété difféomorphe à une demi-boule dont l'intérieur est muni de deux métriques d'Einstein asymptotiquement hyperboliques g_1 et g_2 . Si on a $|g_1 - g_2|_{g_1} = o(e^{-(n-1)r})$ dans le cas réel, ou $|g_1 - g_2|_{g_1} = o(e^{-(m+1)r})$ dans le cas complexe ($n = 2m$), alors il existe un difféomorphisme Φ de la demi-boule préservant point par point le bord à l'infini tel que $g_2 = \Phi^* g_1$.*

Dans le cas réel, l'hypothèse de coïncidence jusqu'à l'ordre $n - 1$ se résume à la coïncidence des structures conformes γ et du terme indéterminé g_{n-1} . Par polyhomogénéité (théorème 1), on a alors une coïncidence à un ordre infini en jauge géodésique : $|g_1 - g_2| = O(e^{-\infty r})$. Les résultats de [3] impliquent alors $g_1 = g_2$, toujours en jauge géodésique, donc le théorème 2 ne nécessite pas de démonstration dans ce cas.

Dans le cas complexe, le nombre et la nature des termes indéterminés reste un peu mystérieuse, mais l'hypothèse de coïncidence jusqu'à l'ordre $n + 2$ assure l'égalité de tous les termes indéterminés de g_1 et g_2 , et donc $|g_1 - g_2| = O(e^{-\infty r})$ dans une jauge géodésique. À partir de cette coïncidence à un ordre infini est employée une méthode similaire à celle de [3], mais compliquée en raison de la complexité de la géométrie hyperbolique complexe d'une demi-boule.

L'article est organisé comme suit : dans un premier temps, nous mettons en place des éléments d'analyse dans un demi-espace hyperbolique. Le cadre géométrique est clair dans le cas réel, mais certaines formules utiles semblent être absentes de la littérature dans le cas complexe, la première section de cet article leur est donc consacrée. Dans la deuxième section, on introduit des espaces à double poids adaptés à la géométrie du demi-espace, nécessaires à cause des coins du bord, et on les utilise pour démontrer des théorèmes d'isomorphisme pour des opérateurs du type du laplacien. La troisième section introduit les métriques asymptotiquement hyperboliques (d'Einstein ou non) dans le cadre local que nous souhaitons considérer, et les décrit dans un système de coordonnées adaptées à la géométrie au voisinage de l'infini. La quatrième section place ces métriques dans une jauge locale adaptée vis-à-vis des difféomorphismes ; c'est ici que l'analyse développée précédemment s'introduit naturellement. La cinquième section étend cette analyse à toutes les métriques asymptotiquement hyperboliques, extension qui est immédiatement utilisée dans la sixième section pour démontrer un lemme technique essentiel de décroissance des dérivées transverses des éléments du noyau des opérateurs du type du laplacien. La septième section contient la preuve de la polyhomogénéité. La section 8, enfin, contient la preuve de la continuation unique.

1. UN MODÈLE DU DEMI-ESPACE HYPERBOLIQUE COMPLEXE

Considérons tout d'abord, à titre d'exemple, un demi-espace hyperbolique réel $\mathbb{R}H_+^n \subset \mathbb{R}H^n$, délimité par un hyperplan totalement géodésique $\mathbb{R}H^{n-1} \subset \mathbb{R}H^n$, espace fixe d'une inversion ι . Dans le modèle du demi-espace supérieur $\{x_1 > 0\}$, avec métrique $\frac{dx_1^2 + \dots + dx_n^2}{x_1^2}$, on peut choisir l'inversion $\iota : x_n \mapsto -x_n$, donc $\mathbb{R}H_+^n = \{x_n > 0\}$, et la métrique de $\mathbb{R}H^n$ s'écrit sous la forme agréable

$$(1) \quad g_h = dr^2 + \cosh^2(r)\gamma,$$

où r est la distance (avec signe) au bord $\mathbb{R}H^{n-1} = \{x_n = 0\}$ et γ est la métrique hyperbolique sur ce bord $\mathbb{R}H^{n-1}$. Dans ces coordonnées, l'inversion ι est $r \mapsto -r$.

La situation est considérablement plus compliquée dans le cas hyperbolique complexe, car il n'y a pas d'hyperplan totalement géodésique. Classiquement, on choisit à la place un bisecteur, qui est un hyperplan minimal.

Plus précisément, l'espace hyperbolique complexe peut se décrire comme

$$(2) \quad \mathbb{C}H^m = \{[x] \in \mathbb{C}P^m, \langle x, x \rangle < 0\}$$

pour le produit hermitien lorentzien $\langle x, x' \rangle = 4 \operatorname{Re}(\bar{x}_0 x'_m) + \sum_{j=1}^{m-1} \bar{x}_j x'_j$. La métrique hyperbolique complexe, à courbure sectionnelle comprise entre -1 et $-\frac{1}{4}$, est alors donnée au point $x \in \mathbb{C}H^m$ par

$$(3) \quad (g_h)_x(X, X) = 4 \frac{\langle x, x \rangle \langle X, X \rangle - |\langle x, X \rangle|^2}{-\langle x, x \rangle^2}.$$

Soit $f : \mathbb{C}H^m \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par $f(x) = -\frac{\langle x, x \rangle}{4|x_0|^2}$. Dans la carte affine $z_0 = -1$, on peut la voir comme la fonction $f : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{R}$ obtenue par $f(z_1, \dots, z_m) = \operatorname{Re}(z_m) - \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{m-1} |z_i|^2$. Cela mène au modèle du demi-espace de Siegel, dans lequel l'espace hyperbolique complexe est le domaine

$$(4) \quad \mathbb{C}H^m = \{f(z_1, \dots, z_m) > 0\},$$

et sa métrique s'écrit

$$(5) \quad g = \frac{df^2 + \eta^2}{f^2} + \frac{|dz_1|^2 + \dots + |dz_{m-1}|^2}{f},$$

où l'on a posé $z_m = f + \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{m-1} |z_i|^2 - iv$ et

$$(6) \quad \eta = dv + \frac{1}{2} \operatorname{Im}(\bar{z}_1 dz_1 + \dots + \bar{z}_{m-1} dz_{m-1}).$$

On considère le demi-espace hyperbolique complexe,

$$(7) \quad \mathbb{C}H_+^m = \{\operatorname{Im}(z_m) < 0\} = \{v > 0\},$$

dont le bord est le bisecteur

$$(8) \quad B = \{\operatorname{Im}(z_m) = 0\}.$$

Ce bisecteur est l'hypersurface équidistante des deux points $(0, \pm z_m)$, pour un $z_m \in \mathbb{R}$. La géodésique

$$(9) \quad \{(0, iz_m), z_m \in \mathbb{R}\}$$

engendre l'*épine complexe* du bisecteur, à savoir la géodésique complexe

$$(10) \quad \Sigma = \{(0, z_m), \operatorname{Re}(z_m) > 0\},$$

qui intersecte le bisecteur en son *épine*, la géodésique (réelle)

$$(11) \quad \sigma = \Sigma \cap B = \{(0, z_m), z_m \in \mathbb{R}_+^*\}.$$

Le but de cette section est de donner une expression de la métrique du demi-espace hyperbolique complexe en termes de la distance et de la projection sur le bisecteur (nous n'avons pas trouvé cette formule dans la littérature). Prenons sur le bisecteur des coordonnées $(\tau, \rho, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^* \times S^{2m-3}$, telles que

$$(12) \quad ((z_1, \dots, z_{m-1}), z_m) = (2e^{\frac{\tau}{2}} \tanh(\frac{\rho}{2})y, e^\tau).$$

Soit $\theta = J \frac{d\rho}{\rho}$ la forme de contact standard sur la sphère S^{2m-3} , et γ' la restriction de la métrique standard de la sphère à la distribution de contact $\ker \theta$.

Nous paramétrons donc un point de $\mathbb{C}H_+^m$ par sa distance s au bisecteur et sa projection (τ, ρ, y) sur celui-ci. Posons

$$(13) \quad \vartheta_1 = \theta + \frac{\tanh \frac{s}{2}}{2 \cosh \frac{\rho}{2}} d\tau,$$

$$(14) \quad \vartheta_2 = (1 + \tanh^2 \frac{s}{2}) d\tau + 2 \frac{\sinh^2 \frac{\rho}{2}}{\cosh \frac{\rho}{2}} \tanh(\frac{s}{2}) \theta.$$

Lemme 1.1. *La métrique hyperbolique complexe sur $\mathbb{C}H_+^m$ s'écrit en fonction de la distance au bisecteur et de la projection sur celui-ci,*

$$(15) \quad g = ds^2 + \cosh^4(\frac{s}{2}) \cosh^2(\frac{\rho}{2}) \vartheta_2^2 + \cosh^2(\frac{s}{2}) [d\rho^2 + \sinh^2(\rho) \vartheta_1^2 + 4 \sinh^2(\frac{\rho}{2}) \gamma']$$

Si la variable s décrit $\mathbb{R}$ tout entier, alors les formules (13), (14) et (15) restent valables et donnent un modèle de la métrique hyperbolique complexe sur $\mathbb{C}H^m$ entier. Il y a aussi une inversion holomorphe de $\mathbb{C}H^m$,

$$(16) \quad \iota : (s, \tau) \mapsto (-s, -\tau),$$

qui échange les deux demi-espaces.

Sur le bisecteur lui-même ($s = 0$), on obtient la formule classique

$$(17) \quad \cosh^2(\frac{\rho}{2}) d\tau^2 + d\rho^2 + \sinh^2(\rho) \theta^2 + 4 \sinh^2(\frac{\rho}{2}) \gamma'.$$

On retrouve l'épine σ du bisecteur en faisant $\rho = 0$, et les fibres de la projection sur l'épine — les niveaux de τ —, sont des hyperplans $\mathbb{C}H^{m-1}$ totalement géodésiques dans $\mathbb{C}H^m$. L'hyperplan $\tau^{-1}(0)$, qui coupe la géodésique (9), est le lieu fixe de l'inversion ι .

Donnons le changement de coordonnées sur $\mathbb{C}H^m$, prolongeant (12), et permettant de passer à cette formule. On écrit

$$(18) \quad ((z_1, \dots, z_{m-1}), z_m) = (e^{\frac{\tau+i\alpha}{2}} ty, e^{\tau+i\alpha}),$$

où $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ et $0 \leq t < 2\sqrt{\cos \alpha}$. Le changement de variables est alors donné par

$$(19) \quad te^{i\frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \sinh \frac{\rho}{2}}{\cosh \frac{\rho}{2} + i \tanh \frac{s}{2}}.$$

Enfin, la structure complexe de $\mathbb{C}H^m$ est donnée par

$$(20) \quad Jdr = \cosh^2(\frac{s}{2}) \cosh(\frac{\rho}{2}) \vartheta_2, \quad Jd\rho = \sinh(\rho) \vartheta_1.$$

Finalement, observons que la formule (15) a un comportement un peu curieux quand $\rho \rightarrow +\infty$, puisqu'alors $\vartheta_1 \rightarrow \theta$ et $\vartheta_2 \sim 2 \sinh(\frac{\rho}{2})\theta$, donc la base choisie pour écrire la métrique dégénère. En remplaçant ϑ_1 par $\vartheta_1 - \frac{\cosh \frac{\rho}{2}}{2 \sinh^2(\frac{\rho}{2}) \tanh(\frac{s}{2})} \vartheta_2 \sim \frac{d\tau}{2 \cosh \frac{\rho}{2}}$ quand s et ρ tendent vers l'infini, on obtient

$$(21) \quad g = ds^2 + \cosh^4(\frac{s}{2}) \cosh^2(\frac{\rho}{2}) \vartheta_2^2 + \cosh^2(\frac{s}{2}) [d\rho^2 + \sinh^2(\frac{\rho}{2})(d\tau^2 + 4\gamma')] + O(\frac{1}{\cosh^2 \frac{s}{2}}).$$

En particulier, cette formule nous dit que, quand $\rho \rightarrow +\infty$, les directions de contact explosent en $\cosh \frac{s}{2}$, contrairement à ce qu'une lecture trop rapide de (15) eut indiqué.

Preuve du lemme 1.1. – Par simplicité, on se restreint au cas de la dimension $m = 2$, l'extension en dimension supérieure étant évidente. Le point crucial est de calculer les géodésiques orthogonales au bisecteur. Par rapport aux notations précédentes, on posera $y = e^{i\beta}$ puisque y est une variable circulaire si $m = 2$. Considérons le bisecteur

$$(22) \quad B_s = \{(\sqrt{s}te^{i\beta+i\frac{\alpha}{2}}, se^{i\alpha}), |t| < 2\sqrt{\cos \alpha}\}.$$

Ses méridiens $B_{s,\beta}$ s'obtiennent en fixant β , et coupent B en

$$(23) \quad \gamma_{s,\beta} := B \cap B_{s,\beta} = \{(\sqrt{s}te^{i\beta}, s), |t| < 2\}$$

qui est une géodésique orthogonale à l'épine σ au point $(0, s)$.

Affirmation. Les géodésiques du plan méridien $B_{s,\beta}$ qui sont orthogonales à γ sont en réalité orthogonales à B tout entier.

En effet, d'après [9], si x est un point de l'espace hyperbolique, alors sa projection $p(x) = (\sqrt{s}e^{i\beta}t, r)$ sur B , sa projection $\pi(x)$ sur l'épine complexe Σ , et enfin la projection $\xi = \pi(p(x)) = (0, r)$ de $p(x)$ sur l'épine σ engendrent un plan totalement réel. Ce plan, coupant le bisecteur B en la géodésique $\gamma_{s,\beta}$, et l'épine complexe Σ en la géodésique orthogonale à σ en ξ , ne peut être que le méridien $B_{s,\beta}$. Il contient donc la géodésique reliant x à $p(x)$.

Chaque plan méridien $B_{s,\beta}$ est muni de coordonnées (t, α) . Pour l'identifier à un plan hyperbolique réel, on se ramène à $B_{1,0}$ par l'isométrie

$$(z_1, z_2) \rightarrow (\sqrt{s}e^{i\beta}z_1, s).$$

Revenant aux coordonnées homogènes (2), on voit que

$$B_{1,0} = \{[-e^{-i\frac{\alpha}{2}} : t : e^{i\frac{\alpha}{2}}]\} = \{[-u : 1 : \bar{u}]\},$$

avec $u = (te^{i\frac{\alpha}{2}})^{-1}$, satisfaisant $\operatorname{Re} u^2 > \frac{1}{4}$. C'est un modèle de Klein du plan hyperbolique réel, dans lequel les géodésiques orthogonales à $\gamma_{1,0} = \{u \in \mathbb{R}\}$ sont des droites verticales, qu'on paramètre par

$$u = \frac{\cosh \frac{\rho}{2} + i \tanh \frac{s}{2}}{2 \sinh \frac{\rho}{2}}.$$

Ici, ρ est l'abscisse curviligne sur la géodésique $\gamma_{1,0}$, et s la distance à $\gamma_{1,0}$. Cela donne les coordonnées voulues. Le reste de la démonstration du lemme consiste en le calcul de la métrique, que nous ne reproduisons pas ici. $\square$

Un bisecteur est une hypersurface minimale. Le lemme suivant montre que la seconde forme fondamentale de toutes les hypersurfaces équidistantes d'un bisecteur est uniformément bornée.

Lemme 1.2. *Les hypersurfaces $s = \text{cst}$, à distance constante du bisecteur, ont une seconde forme fondamentale uniformément bornée indépendamment de s . Il en est de même de chaque dérivée covariante de la seconde forme fondamentale.*

Preuve. – À partir du lemme 1.1, il s'agit d'un calcul direct. On écrit $g_h = ds^2 + g_s$, alors la seconde forme fondamentale est $\mathbb{I} = -\frac{1}{2}\partial_s g_s$. On obtient pour $g_s^{-1}\mathbb{I}$:

- sur $\frac{\partial}{\partial \rho}$ et sur $\ker \theta \subset TS^{2m-3}$, une valeur propre $-\frac{1}{2} \tanh \frac{s}{2}$;
- dans la base orthonormale $(\cosh^2(\frac{\rho}{2}) \cosh(\frac{\rho}{2})\vartheta_2, \cosh(\frac{\rho}{2}) \sinh(\rho)\vartheta_1)$, une matrice

$$\frac{-1}{2(\cosh^2 \frac{\rho}{2} + \tanh^2 \frac{s}{2})} \times \begin{pmatrix} \tanh(\frac{s}{2})(4 + \sinh^2(\frac{\rho}{2})(3 - \tanh^2 \frac{s}{2})) & \frac{\sinh \rho}{\cosh^3 \frac{\rho}{2}} \\ \frac{\sinh \rho}{\cosh^3 \frac{\rho}{2}} & \tanh(\frac{s}{2})(1 + \tanh^2 \frac{s}{2} \cosh^2 \frac{\rho}{2}) \end{pmatrix}$$

Le lemme se déduit de ces formules. $\square$

Remarquons qu'on peut déduire du lemme la courbure moyenne des hypersurfaces, à savoir

$$(24) \quad H = \operatorname{tr}(g_s^{-1}\mathbb{I}) = -\tanh(\frac{s}{2})\left(m + \frac{2}{\cosh^2(\frac{\rho}{2})(\cosh^2 \frac{\rho}{2} + \tanh^2 \frac{s}{2})}\right).$$

On retrouve ainsi que le bisecteur $s = 0$ est minimal, mais les autres hypersurfaces équidistantes du bisecteur ne sont plus minimales ou à courbure moyenne constante. Il serait intéressant de trouver le feuilletage de $\mathbb{C}H_+^m$ par des hypersurfaces à courbure moyenne constante.

2. ANALYSE SUR UN DEMI-ESPACE

Dans cette section, on va donner quelques outils simples d'analyse sur un demi-espace hyperbolique réel ou complexe. Il y a deux bords sur le demi-espace $\mathbb{R}H_+^n$ ou $\mathbb{C}H_+^m$, quand la distance s au bord intérieur tend vers 0, ou quand on va à l'infini sur chaque tranche $s = \text{cst}$. Cela motive l'introduction d'espaces fonctionnels avec deux poids.

Dans le cas réel, le plus simple, chaque tranche est un espace hyperbolique réel $\mathbb{R}H^{n-1}$, sur lequel on choisit des coordonnées polaires, de sorte que la formule (1) devient

$$(25) \quad g_h = ds^2 + \cosh^2(s)(d\rho^2 + \sinh^2(\rho)g_{S^{n-2}}).$$

Il est naturel de considérer la fonction poids

$$(26) \quad w = \cosh(s)^{\delta_1} \cosh(\rho)^{\delta_2},$$

où δ_1 et δ_2 sont deux réels fixés, et de définir pour $k \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in]0, 1[$ les espaces fonctionnels

$$(27) \quad C_{\delta_1, \delta_2}^k(\mathbb{R}H^n) = \frac{1}{w} C^k(\mathbb{R}H^n), \quad C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}(\mathbb{R}H^n) = \frac{1}{w} C^{k, \alpha}(\mathbb{R}H^n).$$

Dans le cas complexe, au vu de la formule (19), la fonction $f = \text{Re}(z_m) - \frac{1}{4} \sum |z_i|^2$, qui définit le bord de $\mathbb{C}H^m$, s'écrit

$$(28) \quad f = \frac{e^{\frac{\tau}{2}}}{\cosh^2(\frac{s}{2})(\cosh^2(\frac{\rho}{2}) + \tanh^2(\frac{s}{2}))},$$

et il est ainsi naturel de choisir un poids

$$(29) \quad w = \cosh(\frac{s}{2})^{2\delta_1} (\cosh^2(\frac{\rho}{2}) \cosh(\frac{\tau}{2}))^{\delta_2}$$

pour définir, de la même manière, les espaces à poids

$$(30) \quad C_{\delta_1, \delta_2}^k(\mathbb{C}H^m) = \frac{1}{w} C^k(\mathbb{C}H^m), \quad C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}(\mathbb{C}H^m) = \frac{1}{w} C^{k, \alpha}(\mathbb{C}H^m).$$

Une propriété importante des poids choisis, dans les deux cas, est leur invariance par inversion,

$$(31) \quad \iota^* w = w.$$

Lemme 2.1. *Supposons que*

- dans le cas réel, $0 < \delta_1 < n - 1$ et $0 \leq \delta_2 \leq n - 2$;
- dans le cas complexe, $0 < \delta_1 < m$ et $0 \leq \delta_2 \leq m - \frac{1}{2}$ (et $\delta_2 \leq \frac{5}{4}$ si $m = 2$).

Alors il existe une constante $c(\delta_1) > 0$, dépendant de δ_1 seulement, telle que

$$(32) \quad -\Delta \log w - |d \log w|^2 > c(\delta_1).$$

Dans ce lemme, l'intervalle sur δ_1 est optimal, mais on n'a pas essayé d'obtenir un intervalle optimal pour le poids δ_2 . La démonstration montrera que, pour chaque valeur de δ_1 , on peut admettre des valeurs de δ_2 qui s'écartent de l'intervalle indiqué dans le lemme.

Preuve. – Commençons par le cas réel. Écrivons $w = e^u$, où

$$u = \delta_1 \log \cosh s + \delta_2 \log \cosh \rho =: u_1 + u_2.$$

Il faut calculer $-\Delta u - |du|^2$. Puisque ds et $d\rho$ sont orthogonaux, on a

$$-\Delta u - |du|^2 = -\Delta u_1 - |du_1|^2 - \Delta u_2 - |du_2|^2,$$

et on calcule :

$$-\Delta u_1 - |du_1|^2 = \delta_1(1 + (n - 2 - \delta_1) \tanh^2 s),$$

$$-\Delta u_2 - |du_2|^2 = \frac{\delta_2}{\cosh^2 s} (1 + (n - 3 - \delta_2) \tanh^2 \rho).$$

Le lemme s'en déduit immédiatement.

Le cas complexe est plus compliqué, mais heureusement ds , $d\rho$ et $d\tau$ sont orthogonaux, et en outre $\Delta\tau = 0$. Cela simplifie les calculs : on pose $u_1 = 2\delta_1 \log \cosh \frac{s}{2}$, $u_2 = 2\delta_2 \log \cosh \frac{\rho}{2}$ et $u_3 = \delta_2 \log \cosh \frac{\tau}{2}$, alors, si on pose $p = \tanh^2 \frac{s}{2}$ et $\varpi = \tanh^2 \frac{\rho}{2}$, on obtient :

$$\begin{aligned} -\Delta u_1 - |du_1|^2 &= \delta_1 \left(\frac{1}{2} + (m - \frac{1}{2} - \delta_1)p + \frac{p(1-p)(1-\varpi)}{1+p(1-\varpi)} \right), \\ -\Delta u_2 - |du_2|^2 &= \frac{\delta_2}{\cosh^2 \frac{s}{2}} \left(m - 1 + (\frac{1}{2} - \delta_2)\varpi - \frac{p\varpi(1-\varpi)}{1+p(1-\varpi)} \right), \\ -\Delta u_3 - |du_3|^2 &= -\frac{\delta_2^2}{4 \cosh^2 \frac{s}{2}} \frac{(1-\varpi)(1-p(1-\varpi))}{(1+p(1-\varpi))^2}. \end{aligned}$$

Puisque p et ϖ prennent leurs valeurs dans $[0, 1]$, la formule sur u_1 donne immédiatement la condition sur le poids δ_1 . De l'équation sur u_3 nous déduisons

$$-\Delta u_3 - |du_3|^2 \geq -\frac{\delta_2^2(1-\varpi)}{4 \cosh^2 \frac{r}{2}},$$

d'où résulte, posant $v = u_2 + u_3$,

$$\begin{aligned} -\Delta v - |dv|^2 &\geq \frac{\delta_2}{\cosh^2 \frac{r}{2}} \left(m - 1 + (\frac{1}{2} - \delta_2)\varpi - \varpi(1-\varpi) - \frac{1}{4}\delta_2(1-\varpi) \right) \\ &\geq \frac{\delta_2}{\cosh^2 \frac{r}{2}} \left((m - \frac{1}{2} - \delta_2) - (1-\varpi)(\varpi + \frac{1}{2} - \frac{3}{4}\delta_2) \right) \end{aligned}$$

Si $m \geq 3$ et $0 \leq \delta_2 \leq m - \frac{1}{2}$, cette quantité est positive ; si $m = 2$, elle est positive en se restreignant à $\delta_2 \leq \frac{5}{4}$ (nous n'avons fait ici aucun effort pour obtenir la meilleure borne). $\square$

Remarque 2.2. Posons $\mathcal{H} = n - 1$ dans le cas réel, $\mathcal{H} = m$ dans le cas complexe, donc $\mathcal{H}$ est, au signe près, la limite de la courbure moyenne des hypersurfaces de niveau de s quand s tend vers l'infini. On observera que dans chaque cas, on a

$$(33) \quad \lim_{r \rightarrow \infty} -\Delta \log w - |d \log w|^2 = \delta_1(\mathcal{H} - \delta_1).$$

En revanche, la constante $c(\delta_1)$ ne peut pas être prise égale à cette limite.

L'existence d'un poids vérifiant l'inégalité différentielle (32) permet de déduire immédiatement le comportement du laplacien dans les espaces à poids $C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}$. En effet, observons que, pour toute fonction f , on a l'identité

$$(34) \quad w\Delta f = \Delta(wf) + (-\Delta \log w - |d \log w|^2)wf + 2\langle d \log w, d(wf) \rangle.$$

Nous noterons maintenant génériquement H l'espace hyperbolique tout entier (qui est donc, selon le cas considéré, soit l'espace hyperbolique réel $\mathbb{R}H^n$ soit l'espace hyperbolique complexe $\mathbb{C}H^m$) et H_+ le demi-espace avec la métrique calculée dans la section précédente. Si une fonction f est globalement définie sur H , ou bien si f est définie seulement sur un demi-espace hyperbolique H_+ et satisfait la condition de Dirichlet $f = 0$ sur le bord du demi-espace, et si les poids δ_1 et δ_2 satisfont les conditions du lemme 2.1, alors, par principe du maximum,

$$(35) \quad \sup |wf| \leq \frac{1}{c(\delta_1)} \sup |w\Delta f|.$$

Par régularité elliptique, on en déduit immédiatement le lemme suivant.

Lemme 2.3. *Supposons que les poids δ_1 et δ_2 satisfassent les conditions du lemme 2.1. Alors, si $k \geq 2$,*

- (1) *le laplacien, avec condition de Dirichlet, est un isomorphisme*

$${}^0C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}(H_+) \rightarrow C_{\delta_1, \delta_2}^{k-2, \alpha}(H_+),$$

où 0C dénote l'espace avec condition de Dirichlet sur le bord intérieur ;

- (2) *le laplacien sur H entier est un isomorphisme*

$$C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}(H) \rightarrow C_{\delta_1, \delta_2}^{k-2, \alpha}(H).$$

Pour $\lambda \geq 0$, les mêmes résultats restent vrais pour l'opérateur $\Delta + \lambda$, sous la même condition sur δ_2 , et pourvu que

$$(36) \quad \delta_1 \in \left[\frac{\mathcal{H}}{2} - \sqrt{\frac{\mathcal{H}^2}{4} + \lambda}, \frac{\mathcal{H}}{2} + \sqrt{\frac{\mathcal{H}^2}{4} + \lambda} \right].$$

À nouveau, mentionnons que dans cet énoncé, aucun effort particulier n'est fait pour obtenir un intervalle optimal pour le poids δ_2 .

Preuve. — Nous avons déjà montré la première partie du lemme. Reste à démontrer l'énoncé concernant l'opérateur $\Delta + \lambda$. On voit immédiatement que si $\lambda \geq 0$, alors la fonction $-\Delta \log w - |d \log w|^2 + \lambda$ reste minorée par une constante strictement positive, pourvu que δ_1 reste dans l'intervalle prescrit par (36), et sous la même condition sur δ_2 . Le même principe de maximum donne alors immédiatement le résultat. $\square$

Remarque 2.4. Dans le cas $\lambda < 0$, il n'est plus toujours vrai que la fonction $-\Delta \log w - |d \log w|^2 + \lambda$ reste positive sous les conditions du lemme 2.1 : elle ne l'est que pour r assez grand. Le même résultat d'isomorphisme reste néanmoins vrai, avec une démonstration plus compliquée, passant par une

première estimation globale plus faible, puis une seconde estimation à l'infini en utilisant la positivité asymptotique de $-\Delta \log w - |d \log w|^2 + \lambda$. Nous ne donnons pas de détail car nous n'utiliserons pas ce résultat dans l'article.

Examinons maintenant des problèmes d'analyse sur des systèmes. Le cadre général sera celui d'opérateurs géométriques du type $L = \nabla^* \nabla + \mathcal{R}_0$ sur un fibré tensoriel E , où $\mathcal{R}_0$ est un terme de courbure, donc à coefficients constants dans toute base orthonormée. L'analyse de tels opérateurs sur l'espace hyperbolique réel ou complexe est menée dans [2]. Son comportement est gouverné par l'opérateur indicial : si t est la distance à un point, alors l'opérateur L « se comporte » quand t tend vers l'infini comme l'opérateur

$$(37) \quad \mathcal{I} = -\partial_t^2 - \mathcal{H}\partial_t + \tilde{A} + \mathcal{R}_0,$$

où $\tilde{A}$ consiste en les termes d'ordre zéro de $\nabla^* \nabla$ (voir la section 5 pour des détails). Si λ est la plus petite valeur propre de $\tilde{A} + \mathcal{R}_0$, les premiers poids critiques de (37), à savoir les μ tels que $e^{\mu t}$ soit annulé par

$$(38) \quad -\partial_t^2 - \mathcal{H}\partial_t + \lambda$$

sont $\mu_{\pm} = \frac{\mathcal{H}}{2} \pm \sqrt{\frac{\mathcal{H}^2}{4} + \lambda}$. A chaque valeur propre de $\tilde{A} + \mathcal{R}_0$ est en réalité associée une paire de poids critiques ; celle correspondant au i -ème espace propre sera notée $(\mu_-^{(i)}, \mu_+^{(i)})$. L'expression *poids critiques supérieurs* désignera la famille formée par tous les $\mu_+^{(i)}$ (dénomination analogue pour *inférieurs*) ; le poids critique supérieur (resp. inférieur) le plus petit (resp. grand) est

$$\mu_+ = \min_i \mu_+^{(i)} \quad (\text{resp. } \mu_- = \max_i \mu_-^{(i)}).$$

Le poids critique supérieur (resp. inférieur) le plus grand (resp. petit) sera dénoté $\mu_+^{\max}$ (resp. $\mu_-^{\min}$), de telle sorte que tous les poids critiques sont situés dans l'intervalle $[\mu_-^{\min}, \mu_+^{\max}]$.

- Il est montré dans [2] que, si l'opérateur L est inversible dans L^2 , alors :
- L est un isomorphisme $C_{\delta}^{k,\alpha} \rightarrow C_{\delta}^{k-2,\alpha}$ pourvu que $\mu_- < \delta < \mu_+$ (où $C_{\delta}^{k,\alpha} = \frac{1}{\cosh^{\delta} t} C^{k,\alpha}$) ;
 - il existe une constante $c > 0$ telle que la fonction de Green G de L soit contrôlée par la fonction de Green G_{λ} de l'opérateur scalaire $\Delta + \lambda$:

$$(39) \quad |G| \leq c G_{\lambda}.$$

Il en résulte qu'une solution u de l'équation $Lu = v$ sur l'espace hyperbolique satisfait $|u| \leq cu_0$, où u_0 est la fonction solution de $(\Delta + \lambda)u_0 = |v|$. Appliquant le lemme 2.3, on en déduit un contrôle de u_0 dans l'espace C_{δ_1, δ_2}^0 , et donc de u . Le contrôle des autres dérivées vient par régularité elliptique, et il en résulte :

Lemme 2.5. *Soit $L = \nabla^* \nabla + \mathcal{R}_0$ inversible dans L^2 , et $\lambda \geq 0$ la plus petite valeur propre de $\tilde{A} + \mathcal{R}_0$. Si δ_1 et δ_2 satisfont les conditions du lemme 2.3, alors L est un isomorphisme $C_{\delta_1, \delta_2}^{k,\alpha} \rightarrow C_{\delta_1, \delta_2}^{k-2,\alpha}$.* $\square$

Remarque 2.6. Le lemme reste vrai pour $\lambda < 0$, mais comme nous n'avons pas traité ce cas (voir la remarque 2.4), nous ne l'énonçons pas ici.

Remarque 2.7. Le lemme reste vrai si on regarde le problème sur un demi-espace hyperbolique, avec condition de Dirichlet au bord. La démonstration en étant plus compliquée, nous nous contenterons de la remarque plus faible suivante : le lemme reste vrai dans ce cas, si $\lambda \geq 0$ est la plus petite valeur propre de $\mathcal{R}_0$ (et non de $\tilde{A} + \mathcal{R}_0$). En effet, on peut alors utiliser l'inégalité de Kato pour obtenir

$$(40) \quad \langle u, \nabla^* \nabla u \rangle = |u| \Delta |u| + |\nabla u|^2 - |d|u||^2 \geq |u| \Delta |u|,$$

donc $(\Delta + \lambda)|u| \leq |\nabla^* \nabla u + \lambda u|$, ce qui permet d'appliquer le principe du maximum, et donc la démonstration du lemme 2.3.

3. MÉTRIQUES ASYMPTOTIQUEMENT HYPERBOLIQUES

Nous nous plaçons ici sur une variété M de dimension n difféomorphe à une demi-boule B_+ définie par

$$(41) \quad B_+ = \begin{cases} \{x_1^2 + \dots + x_n^2 < 1, x_1 > 0\} & \text{dans le cas réel,} \\ \{(x_1 + \frac{x_3^2 + \dots + x_n^2}{2})^2 + x_2^2 < 1, x_1 > 0\} & \text{dans le cas complexe.} \end{cases}$$

En effet, pour la métrique hyperbolique dans le modèle du demi-espace, le domaine B_+ correspond exactement à un côté d'un hyperplan totalement géodésique (dans le cas réel) ou d'un bisecteur (dans le cas complexe). Nous distinguerons par la suite le bord à l'infini

$$\partial_\infty M \simeq \begin{cases} \{x_2^2 + \dots + x_n^2 < 1, x_1 = 0\} & \text{dans le cas réel,} \\ \{(\frac{x_3^2 + \dots + x_n^2}{2})^2 + x_2^2 < 1, x_1 = 0\} & \text{dans le cas complexe} \end{cases}$$

et le bord à l'intérieur

$$\partial M = \begin{cases} \{x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1, x_1 > 0\} & \text{dans le cas réel,} \\ \{(x_1 + \frac{x_3^2 + \dots + x_n^2}{2})^2 + x_2^2 = 1, x_1 > 0\} & \text{dans le cas complexe,} \end{cases}$$

tous deux difféomorphes à une boule ouverte d'un espace euclidien de dimension $n - 1$, et de bord commun la sphère

$$S = \partial \bar{M} \cap \partial_\infty \bar{M}.$$

Observons maintenant que nous disposons de la dilatation, pour $t > 0$,

$$(42) \quad h_t(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} (tx_1, \dots, tx_n) & \text{dans le cas réel,} \\ (tx_1, tx_2, \sqrt{t}x_3, \dots, \sqrt{t}x_n) & \text{dans le cas complexe.} \end{cases}$$

Elle laisse invariante la métrique hyperbolique

$$(43) \quad g_h = \begin{cases} \frac{dx_1^2 + \dots + dx_n^2}{x_1^2} & \text{dans le cas réel,} \\ \frac{dx_1^2 + dt^2}{x_1^2} + \frac{dx_3^2 + \dots + dx_n^2}{x_1} & \text{dans le cas complexe.} \end{cases}$$

Nous munissons maintenant M d'une métrique asymptotiquement hyperbolique réelle ou hyperbolique complexe. Cela signifie que, près de $x_1 = 0$, la métrique g est asymptote à

$$(44) \quad g_0 = g_0(\gamma) := \begin{cases} \frac{(dx_1)^2 + \gamma}{x_1^2} & \text{dans le cas réel,} \\ \frac{(dx_1)^2 + \eta^2}{x_1^2} + \frac{\gamma}{x_1} & \text{dans le cas complexe.} \end{cases}$$

Dans le cas réel, γ est une métrique sur $\partial_\infty M$; dans le cas complexe, η est une 1-forme de contact sur $\partial_\infty M$, on choisit une structure presque complexe J sur la distribution de contact $\ker \eta$, de sorte que $\gamma(\cdot, \cdot) = d\eta(\cdot, J\cdot)$ soit une métrique sur $\ker \eta$; l'ensemble forme donc une structure (presque) CR (Cauchy-Riemann). Comme notre but dans cet article est une étude locale près de l'origine, on peut toujours se restreindre à une plus petite demi-boule, ramenée à B_+ par dilatation. Aussi peut-on supposer dans le cas complexe que dans les coordonnées locales

$(x_1, x_2, \dots, x_n)$ la forme de contact a la forme standard (6) :

$$(45) \quad \eta = dx_2 + \frac{1}{2}(x_3 dx_4 - x_4 dx_3 + x_5 dx_6 - x_6 dx_5 + \dots).$$

Enfin, on peut aussi supposer, quitte à modifier à nouveau les coordonnées, qu'à l'origine, la métrique γ est égale à celle du modèle hyperbolique, à savoir $\gamma(0) = dx_2^2 + \dots + dx_n^2$ dans le cas réel, et $\gamma(0) = dx_3^2 + \dots + dx_n^2$ dans le cas complexe. Dans ce cas, les dilatations h_t ramènent g_0 à g_h quand t tend vers 0 :

$$(46) \quad h_t^* g_0 \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} g_h.$$

On notera $\mathcal{M}$ l'espace des métriques γ , toujours prises C^∞ . De manière plus précise, nous dirons maintenant que g est asymptotiquement hyperbolique s'il existe $\delta > 0$ tel que $g - g_0 \in C_\delta^{1,\alpha}$, où

$$(47) \quad C_\delta^{k,\alpha} = x^\delta C^{k,\alpha}(g_0)$$

(où nous noterons désormais $x = x_1$). Les métriques g , g_0 , et la métrique hyperbolique g_h sont quasi-isométriques. Aussi les espaces de Hölder à poids (47) peuvent être définis indifféremment par rapport à g_0 ou g_h (mais pas par rapport à g qui a priori n'est pas supposée lisse).

La donnée de la métrique γ sur le bord n'est pas un invariant de la métrique asymptotiquement hyperbolique. En effet, un changement de coordonnées de la forme $\bar{x} = xe^\omega$ où ω est une fonction sur $\partial_\infty M$ change γ en $e^{2\omega}\gamma$ ou $e^\omega\gamma$ suivant le cas. La seule donnée géométrique est donc la structure conforme $[\gamma]$ dans le cas réel, ou la structure (presque) CR donnée par $[\eta]$ et J dans le cas complexe (par souci de simplicité, nous utiliserons le vocable « classe conforme » dans les deux cas, la situation complexe pouvant être vue comme une structure conforme sur une distribution de codimension 1).

Étant donnée une métrique asymptotiquement hyperbolique, il sera utile de choisir un représentant de $[\gamma]$ adapté à la géométrie de la demi-boule, et des coordonnées nous rapprochant des modèles (1) et (15). Dans le cas réel,

ce choix est fait dans [3, section 4] : sur $\partial_\infty M$ et partant d'une métrique γ régulière jusqu'au bord S inclus, on considère y la distance pour γ au bord S , de sorte que près de S on a

$$(48) \quad \gamma = dy^2 + \bar{\gamma}_y,$$

où γ_y est une famille de métriques sur S . On pose alors

$$(49) \quad x = \frac{2u}{1+u^2}v, \quad y = \frac{1-u^2}{1+u^2}v,$$

pour obtenir

$$(50) \quad g_0 = \frac{1}{u^2} \left(du^2 + \frac{(1+u^2)^2}{4} \frac{dv^2 + \bar{\gamma}_y}{v^2} \right).$$

Cette formule généralise l'écriture de la métrique hyperbolique comme

$$(51) \quad g_h = \frac{1}{u^2} \left(du^2 + \frac{(1+u^2)^2}{4} \frac{dv^2 + dx_3^2 + \cdots + dx_n^2}{v^2} \right)$$

(c'est la formule (1) avec $r = -\log u$). Par rapport à la coordonnée u , l'infini conforme de g_0 devient le représentant de $[\gamma]$ donné par

$$(52) \quad \tilde{\gamma} = \frac{\gamma}{4y^2} = \frac{dy^2 + \bar{\gamma}_y}{4y^2},$$

une métrique asymptotiquement hyperbolique sur $\partial_\infty M$.

Le cas complexe est plus délicat. Tous les points de la sphère de Heisenberg S ne sont pas équivalents, la structure de contact devient tangente à S aux deux points $p_\pm = (x_2 = \pm 1, x_3 = \cdots x_n = 0)$. Nous commençons par rendre la structure CR standard en ces deux points. Sans être absolument nécessaire, cette normalisation permet de simplifier les calculs.

Lemme 3.1. *Quitte à faire agir un contactomorphisme de $\partial_\infty M$, on peut supposer que la structure CR J coïncide avec la structure CR standard J_0 aux deux points $p_\pm$.*

Preuve. — C'est un fait classique, laissé au lecteur. Si J est assez proche de J_0 , on peut s'arranger pour que le contactomorphisme ne modifie qu'un petit voisinage de p_+ et p_- . $\square$

Nous passons à une seconde normalisation, analogue au choix de la coordonnée y dans le cas réel de sorte que (48) soit satisfaite. Prenons des coordonnées $Z = (z_i)$ sur la sphère de Heisenberg épointée $S - \{p_+\} = \mathbb{C}^{m-1}$, et une coordonnée transverse y , de sorte que la structure de contact s'écrive sous la forme standard $\eta = dy + \eta'$, où $\eta' = \frac{1}{2} \text{Im}(\bar{z}_1 dz_1 + \cdots + \bar{z}_{m-1} dz_{m-1})$. Le point p_- correspond donc à $z_i = 0$. Considérons sur S la fonction

$$\varphi = |d_H y|^2,$$

où l'indice H signifie qu'on évalue la norme de la restriction de dy à la distribution de contact. Pour le modèle hyperbolique complexe, on calcule immédiatement $\varphi = \frac{r^2}{4}$; en général, la fonction φ ne s'annule pas sur $S -$

$\{p_{\pm}\}$, et son comportement près de $p_{\pm}$, par le lemme 3.1, est celui du modèle, à savoir $\varphi = \frac{r^2}{4} + O((\frac{r}{1+r^2})^3)$ près de $p_{\pm}$.

Lemme 3.2. *Quitte à faire agir un contactomorphisme de $\partial_{\infty}M$, préservant globalement S , on peut supposer que la fonction φ est égale à sa valeur pour le modèle, à savoir $\varphi = \frac{r^2}{4}$.*

Preuve. – On fait agir l'exponentielle d'un champ de vecteurs préservant la structure de contact, $X_f = f\partial_y - \sharp d_H f$, où $\sharp\alpha$ est le vecteur horizontal défini par $\sharp\alpha \lrcorner d\eta = \alpha$, et on choisit la fonction réelle

$$f(s, y) = g(s)y.$$

Alors $X_f = y(g\partial_y - \sharp d_H g) + \frac{g}{2}r\partial_r$ est tangent au bord $S = \{y = 0\}$, et y coïncide avec le vecteur radial $\frac{g}{2}r\partial_r$. Il en résulte, le long de S ,

$$\mathcal{L}_{X_f} d_H y = -\frac{g}{2}r\partial_r \lrcorner d\eta = g d_H y.$$

En ajustant g , on peut s'arranger pour que le flot (ψ_t) de contactomorphismes engendré par X_f satisfasse $|\psi_1^* d_H y| = \frac{r}{2}$, ou, de manière équivalente, $|d_H y|_{(\psi_1)_* J} = \frac{r}{2}$. $\square$

Maintenant, on écrit explicitement le changement de variables qui permet d'obtenir les formules du lemme 1.1. Étendons la fonction φ sur B_+ par la formule

$$\varrho = \sqrt{(x + \varphi)^2 + y^2}.$$

Posons alors

$$(53) \quad u = \frac{2x}{x - \varphi + \varrho}, \quad v^2 = \frac{x - \varphi + \varrho}{x + \varphi + \varrho}.$$

Utilisant

$$(54) \quad V = v\sqrt{1 - u},$$

on en tire

$$(55) \quad x = \frac{uv^2\varrho}{1 + V^2}, \quad y = \frac{2V\varrho}{1 + V^2}, \quad \varphi = \varrho \frac{1 - V^2}{1 + V^2}.$$

On observe facilement que $u \leq 1$ et $v \leq 1$. Le passage de (x, y) à (u, v) présente une certaine analogie avec le cas réel. Finalement, on tordra les coordonnées en les ramenant par l'application F définie par

$$(56) \quad F(u, v, Z) = (x, y, e^{-i \arctan V} Z).$$

Lemme 3.3. *Les coordonnées dans lesquelles la métrique hyperbolique complexe a la forme du lemme 1.1 sont données par*

$$\frac{1}{u} = \cosh^2 \frac{s}{2}, \quad \frac{1}{v} = \cosh \frac{\rho}{2}, \quad \varrho = e^{-2\tau}.$$

Preuve. – Le calcul se fait à partir des formules (18) et (19). $\square$

Passons maintenant à la métrique asymptotiquement hyperbolique complexe $g_0 = \frac{dx^2 + dy^2}{x^2} + \frac{dz^2}{x}$. On va maintenant montrer qu'elle a une forme convenue dans les mêmes coordonnées que pour g_h .

La métrique γ le long de S s'écrit

$$(57) \quad \gamma = \frac{|d_H y|^2}{\varphi} + \bar{\gamma}, \quad \bar{\gamma} = \frac{|Jd_H y|^2 + 4\bar{\gamma}'}{\varphi},$$

où $4\bar{\gamma}'/\varphi$ est la métrique induite sur la distribution complexe maximale $C \subset TS \cap \ker \eta$.

Pour la métrique hyperbolique g_h , on a $\gamma = \frac{d\varphi^2}{\varphi} + 4\varphi\gamma_{S^{2m-3}}$. En particulier, $\bar{\gamma}' = \gamma'$, où, comme dans le lemme 1.1, γ' est la métrique standard sur la distribution de contact de la sphère S^{2m-3} . Vu le lemme 3.1, dans le cas général, on a $\bar{\gamma}' \rightarrow \gamma'$ aux points $p_{\pm}$. On obtient alors les formules suivantes, qui généralisent le lemme 1.1 :

Lemme 3.4. *Posons*

$$(58) \quad \tilde{\eta} = \frac{1}{v^2 \varrho} (\eta' + \frac{2V}{1+V^2} d\varrho).$$

Alors

$$(59) \quad g_0 = \frac{1}{1-u} \frac{du^2}{u^2} + \frac{\tilde{\eta}^2}{u^2} + \frac{\tilde{\gamma}}{u} + O(\sqrt{uv}),$$

où $\tilde{\gamma}$ est une métrique sur le bord à l'infini $\{u = 0\}$, définie sur la distribution de contact, et satisfaisant, quand $v \rightarrow 0$,

$$(60) \quad \tilde{\gamma} = \frac{4dv^2 + \varrho^{-1}\bar{\gamma}}{v^2} + O(v).$$

En outre, au voisinage de $p_{\pm}$:

$$(61) \quad \varrho^{-1}\bar{\gamma} \sim \frac{d\varrho^2}{\varrho^2} + 4\gamma'.$$

Les dérivées covariantes des termes $O(\sqrt{uv})$ sont aussi $O(\sqrt{uv})$.

Remarque 3.5. Il est clair dans cette formule (ou aussi bien dans celles du lemme 3.3), qu'une équation lisse du bord intérieur $\{u = 1\}$ est $\sqrt{1-u}$ plutôt que $1-u$.

Preuve. – Le premier terme donne :

$$(62) \quad \begin{aligned} \frac{dx^2}{x^2} &= \left(\frac{du}{u} + 2\frac{dv}{v} + \frac{d\varrho}{\varrho} - \frac{2dV}{1+V^2} \right)^2 \\ &= \frac{du^2}{u^2} + 4\frac{du}{u} \frac{dv}{v} + 4\frac{dv^2}{v^2} + O(\sqrt{uv}). \end{aligned}$$

Le $O(\sqrt{uv})$ est évalué par rapport à la forme (59) que nous visons pour la métrique.

Un calcul plus délicat, prenant en compte la rotation (56) sur la coordonnée Z , est laissé au lecteur, qui arrivera à l'égalité sur les formes de contact :

$$\frac{\eta}{x} = \frac{\tilde{\eta}}{u}.$$

Il reste à examiner le terme $\frac{\gamma}{x} = \frac{(1+V^2)\gamma}{uv^2\varrho}$. Remarquons que $d_H y = dy - \eta$, d'où résulte $\frac{|d_H y|^2}{x} = \frac{|dy|^2}{x} + O(\sqrt{x}) = \frac{|dy|^2}{x} + O(\sqrt{uv}\varrho)$. Ainsi dans le calcul, peut-on remplacer $d_H y$ par dy sans modifier l'asymptotique de la métrique. Or, après calcul,

$$\begin{aligned} \frac{|dy|^2}{\varphi x} = \frac{4}{u(1-V^2)} & \left((1-u) \left(\frac{1-V^2}{1+V^2} \frac{dv}{v} + \frac{d\varrho}{\varrho} \right)^2 \right. \\ & \left. + \frac{1-V^2}{1+V^2} \frac{du^2}{4(1-u)} - \frac{1-V^2}{1+V^2} \left(\frac{1-V^2}{1+V^2} \frac{dv}{v} + \frac{d\varrho}{\varrho} \right) \right). \end{aligned}$$

Analysant chaque terme, il reste

$$(63) \quad \frac{|dy|^2}{\varphi x} = \frac{4(1-u)}{u} \left(\frac{dv^2}{v^2} + O(v) \right) - \frac{du^2}{1-u} - 4 \frac{du}{u} \frac{dv}{v} + O(\sqrt{uv}).$$

L'addition de (62) et (63) donne

$$\frac{dx^2}{x^2} + \frac{|dy|^2}{\varphi x} = \frac{1}{1-u} \frac{du^2}{u^2} + \frac{1}{u} \left(\frac{dv^2}{v^2} + O(v) \right) + O(\sqrt{uv}).$$

Le reste de la métrique se traite de manière similaire. $\square$

4. JAUGE LOCALE

Nous continuons ici notre étude des métriques asymptotiquement hyperboliques. Nous disposons sur l'espace modèle des coordonnées adaptées à un demi-espace définies dans les sections précédentes et des espaces à double poids $C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}$ de la section 2. Par rapport à cet espace à poids, la condition initiale $g - g_0 \in C_{\delta}^{1, \alpha}$ implique $g - g_0 \in C_{\delta, \delta}^{1, \alpha}$. Plus généralement, nous avons

Lemme 4.1. *Pour tous $k \in \mathbb{N}$, $\alpha \in]0, 1[$, et tout $\delta \geq 0$, l'espace $C_{\delta}^{k, \alpha}$ est inclus dans $C_{\delta, \delta}^{k, \alpha}$. La même conclusion est valable sur un demi-espace hyperbolique.*

Preuve. — C'est une conséquence immédiate des changements de variable calculés dans la section précédente. D'une part, dans le cas réel, on a

$$x = \frac{2uv}{1+u^2} \quad \text{avec } w = u^{-\delta_1} v^{-\delta_2}.$$

D'autre part, dans le cas complexe, on a

$$x = uv^2 \tilde{\psi} \quad \text{avec } w = u^{-\delta_1} (v^2 \psi)^{-\delta_2},$$

ce qui conclut la preuve. $\square$

La première étape de la démonstration de la régularité locale consiste à trouver une jauge locale pour l'action des difféomorphismes pour la métrique $h_t^* g$, si t est assez petit (c'est-à-dire en se restreignant à une plus petite boule si nécessaire). Soit l'opérateur de Bianchi agissant sur les formes bilinéaires symétriques,

$$(64) \quad B_g = \delta_g + \frac{1}{2} d \operatorname{tr}_g.$$

Définissons un groupe de difféomorphismes $\mathcal{D}_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}$ de la demi-boule M , induisant l'identité au bord à l'infini $x_1 = 0$, en disant que $\Phi \in \mathcal{D}_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}$ si $\Phi = \exp_{g_0}(X)$ pour un champ de vecteurs $X \in C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}$. Soit g_0 est la métrique définie par (44), et $\bar{g}$ une autre métrique, fixée, avec le même comportement asymptotique : $\bar{g} - g_0 \in C_{\delta, \delta}^\infty$. Alors on a :

Lemme 4.2. *Pour tout $t > 0$ assez petit, il existe un difféomorphisme $\Phi \in \mathcal{D}_{\delta, \delta}^{2, \alpha}$ de M , induisant l'identité au bord intérieur ∂M , tel que*

$$B_{h_t^* \bar{g}}(\Phi^* h_t^* g) = 0.$$

Preuve. — Observons que quand $t \rightarrow 0$, alors $h_t^* \gamma \rightarrow \gamma_h$ et $h_t^* g \rightarrow g_h$, avec plus précisément

$$(65) \quad \|h_t^*(g - \bar{g})\|_{C_{\delta}^{1, \alpha}} = O(t^\delta), \quad \|h_t^* \bar{g} - g_h\|_{C_0^{k, \alpha}} = O(t).$$

La première inégalité est immédiate, la seconde est une conséquence des raisonnements tenus dans le début de la preuve de la Proposition I.3.5 de [2].

On écrit alors l'équation à résoudre comme $B_{\Phi_* h_t^* \bar{g}}(h_t^* g) = 0$. On obtient le résultat en appliquant le théorème des fonctions implicites à l'opérateur

$$\mathcal{B} : \mathcal{D}_{\delta, \delta}^{2, \alpha} \times \mathcal{M} \times C_{\delta, \delta}^\infty \times C_{\delta, \delta}^{1, \alpha} \longrightarrow C_{\delta, \delta}^\alpha,$$

défini par $\mathcal{B}(\Phi, \gamma, h_0, h) = B_{\Phi_* \bar{g}}(h)$. En effet, d'après [2], la différentielle $\frac{\partial \mathcal{B}}{\partial \Phi}$ au point $(\text{id}, \gamma_h, 0, 0)$ est $B_{g_h} \delta_{g_h}^* = \frac{1}{2}(\nabla^* \nabla - \text{Ric}(g_h))$ où ∇ est la connexion de Levi-Civita de g_h . C'est un isomorphisme par le lemme 2.5, y compris lorsqu'il est restreint aux champs de vecteurs nuls au bord intérieur par la remarque 2.7. $\square$

Remarque 4.3. On n'a pas vraiment utilisé dans cette démonstration les espaces fonctionnels à double poids $C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}$, puisque la résolution pouvait aussi bien se faire dans $C_{\delta}^{k, \alpha}$. Leur utilité apparaîtra plus loin, quand on augmentera δ_1 en laissant fixe δ_2 . Cette méthode permettra d'ignorer les problèmes de comportement des solutions au coin formé par le bord commun au bord intérieur et au bord à l'infini.

Le lemme suivant montre que si g satisfait en outre l'équation d'Einstein, elle est nécessairement lisse dans la jauge précédente :

Lemme 4.4. *Supposons que $g - g_0 \in C_{\delta, \delta}^{1, \alpha}$ et que g soit Einstein. Alors, dans la jauge construite par le lemme 4.2, pour t assez petit, on a $h_t^*(g - \bar{g}) \in C_{\delta, \delta}^\infty$, avec pour tout k une estimation $\|h_t^*(g - \bar{g})\|_{C_{\delta, \delta}^k} \leq c_k \|h_t^*(g - \bar{g})\|_{C_{\delta, \delta}^1}$.*

Preuve. — On se place pour $t > 0$ assez petit, après avoir appliqué la dilatation h_t , que l'on omettra dans la suite de la démonstration. La question est locale, et on est donc ramené à la traiter dans une boule pour $\bar{g}$, avec $\|g - \bar{g}\|_{C_{\delta, \delta}^{1, \alpha}}$ petite (donc en particulier $\|g - \bar{g}\|_{C^0}$ est petite). Dans une boule pour $\bar{g}$ la variation des poids est bornée et l'estimation nécessaire se ramène à estimer $\|g - \bar{g}\|_{C^{k, \alpha}}$ par $\|g - \bar{g}\|_{C^{1, \alpha}}$. C'est un énoncé entièrement analogue à

la régularité des métriques d'Einstein dans des coordonnées harmoniques, et on sera donc concis. La condition de jauge $B_{\bar{g}}g = 0$ s'écrit

$$\bar{g}^{il}(\partial_l g_{ij} - \frac{1}{2}\partial_j g_{il}) = \text{termes d'ordre 0 en } g.$$

D'un autre côté,

$$\text{Ric}_{jk}^g = \frac{1}{2}g^{il}(-\partial_{il}^2 g_{jk} + \partial_{ik}^2 g_{lj} + \partial_{ij}^2 g_{lk} - \partial_{jk}^2 g_{il}) + \text{termes d'ordre } \leq 1 \text{ en } g.$$

L'équation d'Einstein implique donc, en différenciant la première équation,

$$-\bar{g}^{il}\partial_{il}^2 g_{jk} + (g^{il} - \bar{g}^{il})(\partial_{ik}^2 g_{lj} + \partial_{ij}^2 g_{lk} - \partial_{jk}^2 g_{il}) = \text{termes d'ordre } \leq 1 \text{ en } g.$$

C'est une équation de la forme

$$-h_{jk}^{abcd}\partial_{ab}^2 g_{cd} = \text{termes d'ordre } \leq 1 \text{ en } g,$$

avec

$$h_{jk}^{abcd} = \bar{g}^{ab}\delta_{jk}^{cd} + \text{termes d'ordre 0 en } g - \bar{g}.$$

Ce qui est important ici est que $\|g - \bar{g}\|_{C^0}$ est petit, donc l'équation est elliptique. Il est alors standard d'en déduire la régularité de g . $\square$

5. ANALYSE SUR LES VARIÉTÉS ASYMPTOTIQUEMENT HYPERBOLIQUES

Dans cette section, nous préparons l'analyse de la polyhomogénéité en introduisant des espaces de sections polyhomogènes et en analysant l'opérateur indiciel.

Soit g une métrique asymptotiquement hyperbolique définie sur une variété M difféomorphe à une demi-boule. Les dilatations h_t de la section précédente fournissent une métrique hyperbolique de référence g_h dans M , induite par $\gamma_h = \lim_{t \rightarrow 0} h_t^* \gamma$. Nous disposons alors des métriques g_h , g_0 et g sur la demi-boule. Pour éviter de considérer l'analyse sur la demi-boule B_+ (et donc d'avoir à introduire une condition au bord sur le bord intérieur), nous recollerons g (ou g_0) avec la métrique hyperbolique sur la demi-boule opposée. Plus précisément, l'espace hyperbolique est la réunion $B_+ \cup B_-$, avec $B_+ = \{s \geq 0\}$ et $B_- = \{s \leq 0\}$. Nous définissons alors une famille de métriques g_t sur $\mathbb{R}H^n$ ou $\mathbb{C}H^m$ par

$$(66) \quad g_t = \chi(s)h_t^*g + (1 - \chi(s))g_h,$$

où χ est une fonction de coupure satisfaisant $\chi(s) = 1$ pour $s \geq 1$ et $\chi(s) = 0$ pour $s \leq 0$ (la même construction peut être appliquée à la métrique g_0 , ou encore à une métrique $\bar{g}$ telle que dans la section précédente, conduisant à une famille notée ci-dessous $\bar{g}_t$). Il est important de noter que les métriques obtenues sont à courbure sectionnelle strictement négative si ces recollements sont faits suffisamment près de l'infini, autrement dit si t est suffisamment petit.

Nous pouvons alors choisir une demi-boule incluse dans la demi-boule d'origine et y effectuer la construction d'un représentant asymptotiquement hyperbolique dans la classe conforme du bord, comme à la fin de la section 3. C'est cette métrique que nous noterons désormais γ .

Nous utiliserons à partir de maintenant, ici comme dans toute la suite, des coordonnées de type exponentiel, comme dans les expressions (25) et (15) des sections 1 et 2, plus adaptées pour la suite que celles de l'expression (44) précédente. Ainsi M est-il identifié à un produit $[0, +\infty) \times \partial_\infty M$, et le terme « dominant » g_0 des g_t est de la forme

$$(67) \quad g_0 = g_0(\gamma) = \begin{cases} ds^2 + e^{2s}\gamma & \text{dans le cas réel,} \\ ds^2 + e^{2s}\eta^2 + e^s\gamma & \text{dans le cas complexe,} \end{cases}$$

avec $\gamma = d\eta(\cdot, J\cdot)$ dans le second cas. Rappelons que γ est ici la métrique sur $\partial_\infty M$, au sein de la classe conforme à l'infini, adaptée à la géométrie de la demi-boule.

Les espaces fonctionnels utiles $C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}$ sont les mêmes que précédemment, les dérivées étant celles de l'espace hyperbolique modèle ou celles de la connexion $\tilde{\nabla}$ définie plus bas, et les normes étant prises relativement à g , g_0 ou g_h , ce qui revient au même de par le lemme 5.2 énoncé plus loin, et du fait que ces trois métriques sont mutuellement bornées.

Nous notons $\dot{\mathcal{A}}_{\alpha, \beta}$ l'espace des fonctions polyhomogènes finies *de poids au moins* $\alpha \geq 0$ dans la direction radiale, c'est-à-dire des sommes finies du type $\sum_{\sigma, \tau} a_{\sigma, \tau} s^\sigma e^{-\tau s}$, où

- les $a_{\sigma, \tau}$ sont des sections *lisses sur le bord à l'infini* (autrement dit constantes en s dans la trivialisatation $[s_0, +\infty[\times \partial M$) et vivant le long des tranches dans un espace à simple poids, dont la valeur est fixée égale à $\beta > 0$;
- les σ et τ sont des réels ;
- tous les poids τ rencontrés dans la somme sont supérieurs ou égaux à α .

Cette définition s'étend immédiatement à des sections de fibrés naturels à condition de prendre les coefficients $a_{\sigma, \tau}$ *parallèles* selon ∂_s (en raison de la croissance exponentielle de la métrique, la trivialisatation par les sections radialement parallèles diffère de la trivialisatation en coordonnées d'une puissance de e^s).

Nous introduisons également les sous-espaces $\mathcal{A}_{\alpha, \beta}$ formé des éléments sans puissances polynômiales (c'est-à-dire que l'on a nécessairement $\sigma = 0$) et $\dot{\mathcal{A}}[\alpha]_\beta$ formé des sommes

$$\sum_{\sigma} a_{\sigma} s^{\sigma} e^{-\tau s}$$

dont le comportement en norme est exactement égal à $e^{-\alpha s}$ (formellement, il s'agit donc du quotient $\dot{\mathcal{A}}_{\alpha, \beta} / \cup_{\alpha' > \alpha} \dot{\mathcal{A}}_{\alpha', \beta}$ mais nous nous passerons de cette subtilité ici). Si $u \in \dot{\mathcal{A}}_{\alpha, \beta}$, on notera $[u]_\alpha$ sa composante de poids α , c'est-à-dire dans $\dot{\mathcal{A}}[\alpha]_\beta$.

Enfin, nous dirons qu'une fonction (ou une section) u est *polyhomogène* s'il existe une série formelle $\sum_{\sigma, \tau} a_{\sigma, \tau} s^\sigma e^{-\tau s}$ telle que pour tout $\delta > 0$, il

existe une somme finie $\sum_{|\tau| \leq N} a_{\sigma, \tau} s^\sigma e^{-\tau s}$ telle que

$$u - \sum_{|\tau| \leq N} a_{\sigma, \tau} s^\sigma e^{-\tau s} \in C_{\delta, \beta}^\infty.$$

De façon équivalente, nous dirons que u appartient à $\dot{\mathcal{A}}_{\alpha, \beta}$ modulo $C_{\infty, \beta}^\infty$. Cette définition dépend de la valeur de β , mais dans la suite β sera fixé et il n'y aura donc pas d'ambiguïté sur la définition.

Nous pouvons maintenant passer à l'analyse dans le cadre asymptotiquement hyperbolique. Notre point de départ est une étude précise du terme dominant de la connexion de Levi-Civita de la métrique g_0 .

Définition 5.1. On peut étendre la connexion de Levi-Civita de γ dans le cas réel, resp. de Tanaka-Webster dans le cas complexe, en une connexion $\tilde{\nabla}$ à l'intérieur de M , unitaire pour g_0 , définie dans le cas réel par

$$\tilde{\nabla} \partial_s = 0, \quad \tilde{\nabla}_{\partial_s}(e^{-s}h) = 0$$

pour tout champ de vecteur γ -unitaire h sur le bord, et dans le cas complexe par

$$\tilde{\nabla} \partial_s = 0, \quad \tilde{\nabla}_{\partial_s}(e^{-s}R) = 0, \quad \tilde{\nabla}_{\partial_s}(e^{-\frac{s}{2}}h) = 0$$

pour tout champ de vecteur γ -unitaire h dans le noyau de η sur le bord et où R désigne le champ de Reeb de la forme de contact η .

Les faits suivants sont démontrés dans [4] en dimension 4 et dans le cas complexe ; il s'obtiennent aisément dans le cas général en suivant les mêmes idées (ils sont d'ailleurs immédiats dans le cas réel).

Lemme 5.2. Dans une base g_0 -orthonormée adaptée $\{\partial_s, e^{-s}h_i\}$ dans le cas réel, resp. $\{\partial_s, e^{-s}R, e^{-s/2}h_i, e^{-s/2}Jh_i\}$ dans le cas complexe, la connexion de Levi-Civita de g_0 diffère de $\tilde{\nabla}$ par une 1-forme à valeurs dans les endomorphismes de TM de la forme

$$a = a_0 + a_1,$$

où a_0 est à coefficients constants (par rapport à $\tilde{\nabla}$) et a_1 est un élément de $\mathcal{A}_{1,1}$ dans le cas réel, $\mathcal{A}_{1/2,1}$ dans le cas complexe. De même, la courbure est

$$R = R_0 + R_1,$$

où R_0 est à coefficients constants, égale à la courbure de l'espace hyperbolique modèle, et R_1 est un élément de $\mathcal{A}_{1,1}$ dans le cas réel, $\mathcal{A}_{1/2,1}$ dans le cas complexe.

Nous considérons maintenant un opérateur différentiel $L = \nabla^* \nabla + \mathcal{R}$ où $\mathcal{R}$ est un terme de courbure, agissant sur les sections d'un fibré tensoriel naturel E . Bien sûr, nous avons en vue le cas où L est la différentielle en une métrique $\bar{g}$ de l'opérateur

$$g \mapsto \text{Ric}^g + cg + (\delta^g)^* B_{\bar{g}}(g).$$

Un premier résultat, élémentaire mais important dans ce contexte, est le suivant :

Lemme 5.3. *Supposons que, pour la métrique hyperbolique, l'opérateur L_h soit inversible dans L^2 . Alors, pour $t > 0$ assez petit, l'opérateur L_t pour la métrique $\bar{g}_t$ est un isomorphisme $C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha} \rightarrow C_{\delta_1, \delta_2}^{k-2, \alpha}$, pour les poids (δ_1, δ_2) satisfaisant les hypothèses du lemme 2.5.*

Preuve. — Par la seconde estimation de (65), on a $\|\bar{g}_t - g_h\|_{C^{k, \alpha}} = O(t)$. Il en résulte que l'opérateur $L - L_h$ est petit en norme d'opérateur $C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha} \rightarrow C_{\delta_1, \delta_2}^{k-2, \alpha}$. Puisque les hypothèses assurent l'inversibilité de L_h entre ces mêmes espaces, l'opérateur L lui aussi est inversible pour $t > 0$ assez petit. $\square$

Nous noterons désormais g , $\bar{g}$ ou g_0 les métriques construites avec un choix de t suffisamment petit pour que le résultat du lemme précédent soit valide pour l'opérateur L considéré.

Il nous faut maintenant analyser plus en détails l'opérateur L_{g_0} bâti à partir de la métrique g_0 . Dans la décomposition $M = [0, +\infty[\times \partial_\infty M$, on peut trivialisier E le long de chaque rayon $\mathbb{R}_+ \times \{y\}$ en y choisissant une base parallèle pour la connexion $\tilde{\nabla}$. Dans cette trivialisatation, la dérivée $\tilde{\nabla}_{\partial_s}$ devient la dérivation ordinaire ∂_s (qu'on prendra garde de ne pas confondre avec la dérivée de Lie $\mathcal{L}_{\partial_s}$).

La décomposition $\nabla^{g_0} = \tilde{\nabla} + a_0 + a_1$ implique alors que l'opérateur L_{g_0} est asymptote sur chaque sous fibré homogène à un opérateur de la forme

$$-\partial_s^2 - \mathcal{H}\partial_s + \tilde{A} + \mathcal{R}_0 + L^{\text{trans}},$$

où ici tous les termes sont indépendants de s : $\tilde{A}$ rassemble tous les termes constants d'ordre 0 dans le laplacien (ce sont les mêmes que ceux de l'opérateur de l'espace hyperbolique), de même $\mathcal{R}_0$ contient les termes constants de la courbure (à nouveau, il s'agit simplement des termes de courbure de l'espace hyperbolique), enfin L^{trans} contient toutes les dérivées transverses à ∂_s (typiquement, par exemple dans le cas complexe, des termes comme $-(\tilde{\nabla}_{e^{-s/2}h})^2$). L'opérateur indicial de L est alors

$$-\partial_s^2 - \mathcal{H}\partial_s + \tilde{A} + \mathcal{R}_0.$$

Deux opérateurs intégraux, définis pour un couple de réels (α_+, α_-) avec $\alpha_+ > \alpha_-$, jouent un rôle important dans ce qui suit. Ils sont définis sur les fonctions par :

$$G_\infty(u)(s) = \frac{1}{\alpha_+ - \alpha_-} \left(e^{-\alpha_- s} \int_{+\infty}^s e^{\alpha_- \varsigma} u(\varsigma) d\varsigma - e^{-\alpha_+ s} \int_{+\infty}^s e^{\alpha_+ \varsigma} u(\varsigma) d\varsigma \right)$$

et de

$$G_0(u)(s) = \frac{1}{\alpha_+ - \alpha_-} \left(e^{-\alpha_- s} \int_{+\infty}^s e^{\alpha_- \varsigma} u(\varsigma) d\varsigma - e^{-\alpha_+ s} \int_{s_0}^s e^{\alpha_+ \varsigma} u(\varsigma) d\varsigma \right),$$

où s_0 est un réel positif supposé très grand par la suite. Ils possèdent les propriétés suivantes :

- (1) Si $\alpha > \alpha_+$, l'opérateur G_∞ envoie les espaces $C_{\alpha,\beta}^\infty$, $\mathcal{A}_{\alpha,\beta}$, $\dot{\mathcal{A}}_{\alpha,\beta}$ et $\dot{\mathcal{A}}[\alpha]_\beta$ dans eux-mêmes ;
- (2) Si $\alpha_- < \alpha \leq \alpha_+$, l'opérateur G_0 envoie $\dot{\mathcal{A}}_{\alpha,\beta}$ dans lui-même, et $C_{\alpha,\beta}^\infty$ et $\mathcal{A}_{\alpha,\beta}$ dans eux-mêmes seulement si $\alpha < \alpha_+$; en revanche, il y a apparition d'un terme polynômial si $\alpha = \alpha_+$.

Ces opérateurs sont des inverses à droite de $\partial_s^2 + \mathcal{H}\partial_s - \lambda$ si le couple (α_-, α_+) est relié à la constante λ par

$$\alpha_\pm = \frac{\mathcal{H}}{2} \pm \sqrt{\frac{\mathcal{H}^2}{4} + \lambda}.$$

Leur définition s'étend aux sections du fibré tensoriel E , en le trivialisant comme ci-dessus radialement sur $[0, +\infty[\times \partial M$. Alors $\tilde{A} + \mathcal{R}_0$ est constant pour $\tilde{\nabla}$ le long des rayons, et ses valeurs propres décomposent $E = \oplus_\lambda E_\lambda$ en la somme de ses sous-espaces propres.

Notre boîte à outils est complétée par une algèbre d'opérateurs adaptée, définie dans le cas réel comme $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}_0 + e^{-s}\mathcal{Q}_1$, où

- $\mathcal{Q}_1$ est l'algèbre engendrée par $\tilde{\nabla}_{\partial_s}$, les $e^{-s}\tilde{\nabla}_H$ (la notation H en indice désignant n'importe quelle dérivée dans une direction tangente au bord à l'infini et indépendante de s) et $\dot{\mathcal{A}}_{0,0}$;
- $\mathcal{Q}_0$ est le sous-espace vectoriel de $\mathcal{Q}_1$ ne contenant que des dérivées transverses à ∂_s et des fonctions de $\dot{\mathcal{A}}_{1,0}$;

et dans le cas complexe comme $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}_0 + e^{-s/2}\mathcal{Q}_1$, où

- $\mathcal{Q}_1$ est l'algèbre engendrée par $\tilde{\nabla}_{\partial_s}$, $e^{-s}\tilde{\nabla}_R$, les $e^{-s/2}\tilde{\nabla}_h$ (h désignant ici une direction dans $H = \text{Ker } \eta$ toujours indépendante de s) et $\dot{\mathcal{A}}_{0,0}$;
- $\mathcal{Q}_0$ est le sous-espace vectoriel de $\mathcal{Q}_1$ ne contenant que des dérivées transverses à ∂_s et des fonctions de $\dot{\mathcal{A}}_{1/2,0}$.

L'utilité de ces algèbres réside dans deux lemmes :

Lemme 5.4. *Soit un opérateur $P \in \mathcal{Q}$. Alors P envoie $C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}$ dans $C_{\delta_1-1, \delta_2}^{k, \alpha}$ dans le cas réel, resp. $C_{\delta_1-1/2, \delta_2}^{k, \alpha}$ dans le cas complexe.* $\square$

Lemme 5.5. *Dans le cas réel, $[\tilde{\nabla}_{\partial_s}, \tilde{\nabla}_H] = 0$ et $e^{-s}[\tilde{\nabla}_H, \tilde{\nabla}_H] \in \mathcal{Q}$; en conséquence $[L_{g_0}, \tilde{\nabla}_H] \in \mathcal{Q}$.*

Dans le cas complexe, $[\tilde{\nabla}_{\partial_s}, \tilde{\nabla}_H] = [\tilde{\nabla}_{\partial_s}, \tilde{\nabla}_R] = 0$, $[\tilde{\nabla}_{e^{-s}R}, \tilde{\nabla}_H] \in \mathcal{Q}$, et pour des champs de vecteurs h_1 et h_2 γ -unitaires dans H ,

$$[\tilde{\nabla}_{e^{-s/2}h_1}, \tilde{\nabla}_{h_2}] = -d\eta(h_1, h_2)\tilde{\nabla}_{e^{-s/2}R} \text{ mod. } \mathcal{Q}.$$

En conséquence, $[L_{g_0}, \tilde{\nabla}_R] \in \mathcal{Q}$, et $[L_{g_0}, \tilde{\nabla}_h] = -2\tilde{\nabla}_{e^{-s/2}Jh}\tilde{\nabla}_{e^{-s/2}R} \text{ mod. } \mathcal{Q}$.

Preuve. – Facile dans le cas réel, voir [4] dans le cas complexe en dimension 4, dont la preuve s'étend presque mot pour mot au cas général. $\square$

Le lemme reste vrai si L_{g_0} est remplacé par tout autre opérateur dans $\mathcal{Q}$ et sera appliqué plus loin à L_g pour les métriques g telles que $g - g_0$ soit polyhomogène (donc $L_g - L_{g_0}$ sera essentiellement dans $\mathcal{Q}$).

6. DÉCROISSANCE DES DÉRIVÉES TRANSVERSES

Comme précédemment, nous considérons ici une métrique asymptotiquement hyperbolique g définie sur une demi-boule.

Convention. Toutes les fonctions et sections qui apparaissent dans la suite, définies *a priori* sur un voisinage du bord à l'infini, seront étendues à l'espace tout entier par le procédé de troncature suivant : choisissant une fois pour toutes une fonction lisse χ d'une variable telle que $\chi(s) = 0$ si $s \leq s_0/2$ et $\chi(s) = 1$ si $s \geq s_0$ (s_0 suffisamment grand), si u est une section définie sur la demi-boule et appartenant à l'espace fonctionnel à double poids $C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}$ de cette demi-boule, φu est définie sur l'espace tout entier et appartient à l'espace fonctionnel de mêmes poids défini sur l'espace tout entier. Ce dernier fait est une conséquence du lemme 1.2.

Cette convention sera en vigueur dans toute cette section comme dans la suivante, et nous ne distinguerons pas dans les notations les sections initialement définies au voisinage de l'infini de leurs versions tronquées et étendues.

Nous considérons toujours un opérateur (issu de la métrique g) du type $L = \nabla^* \nabla + \mathcal{R}$ agissant sur les sections d'un fibré tensoriel naturel E , et nous supposons que l'opérateur hyperbolique modèle L_h est inversible. Après recollement de la métrique g avec la métrique hyperbolique sur l'autre demi-boule (voir le début de la section 5) et choix d'une valeur de t suffisamment petite, le Lemme 5.3 implique immédiatement le résultat suivant, que nous appellerons *lemme de régularité* :

Lemme 6.1. *Soit $\ell \geq k \geq 2$, $\alpha \in]0, 1[$. Si une section u vérifie*

$$u \in C_{\delta', \beta}^{k, \alpha} \text{ et } L(u) \in C_{\delta, \beta}^{\ell-2, \alpha},$$

où $\mu_- \leq 0 < \delta' \leq \delta < \mu_+$ et (δ, β) vérifient les conditions du lemme 2.5, alors nécessairement $u \in C_{\delta, \beta}^{\ell, \alpha}$.

L'objectif de ce paragraphe est de démontrer que le lemme de régularité entraîne un résultat de décroissance des dérivées transverses. Afin d'énoncer plus facilement le résultat, nous appellerons *opérateur polyhomogène au moins quadratique* (d'ordre 2) un opérateur q tel que

(1) il existe une série formelle

$$\sum_{i \geq 2} P_i$$

où chaque P_i est un polynôme de degré i en

$$Id, \partial_s, e^{-s} \widetilde{\nabla}_H, \partial_s^2, e^{-2s} (\widetilde{\nabla}_H)^2, e^{-s} \widetilde{\nabla}_H \partial_s$$

dans le cas réel, et en

$$Id, \partial_s, e^{-s/2} \widetilde{\nabla}_H, e^{-s} \widetilde{\nabla}_R, \partial_s^2, e^{-2s} (\widetilde{\nabla}_R)^2, e^{-s} (\widetilde{\nabla}_H)^2, \\ e^{-s} \widetilde{\nabla}_R \partial_s, e^{-s/2} \widetilde{\nabla}_H \partial_s, e^{-3s/2} \widetilde{\nabla}_R \widetilde{\nabla}_H$$

dans le cas complexe, à coefficients polyhomogènes dans $\mathcal{A}_{0,0}$;

(2) pour tout $\delta > 0$, il existe $N \geq 2$ tel que pour tout u dans $C_{\delta_1, \delta_2}^{k+2, \alpha}$,

$$q(u) - \sum_{2 \leq i \leq N} P_i(u) \in C_{\delta_1 + \delta, \delta_2}^{k, \alpha}.$$

Un exemple typique d'un tel opérateur est la différence entre l'opérateur

$$g \mapsto \text{Ric}^g + (\delta^g)^* B_{\bar{g}}(g) - \text{Ric}^{\bar{g}}$$

agissant sur les métriques asymptotiquement hyperbolique et sa différentielle en la métrique $\bar{g}$ supposée polyhomogène et de même comportement dominant que g . Ce fait se constate facilement par exemple sur les expressions explicites de la courbure de Ricci et de l'opérateur de Bianchi données dans la section 4. Par exemple, on peut écrire tout terme de la forme (matricielle) $g^{-1} \partial^2 g$ comme (en notant $g = \bar{g} + r$) :

$$\begin{aligned} (\bar{g} + r)^{-1} \partial^2 (\bar{g} + r) &= \bar{g}^{-1} \partial^2 \bar{g} + (\bar{g}^{-1} \partial^2 r - \bar{g}^{-1} r \bar{g}^{-1} \partial^2 \bar{g}) \\ &\quad + \bar{g}^{-1} r \bar{g}^{-1} \partial^2 r + \bar{g}^{-1} \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k (r \bar{g}^{-1})^k \partial^2 (\bar{g} + r). \end{aligned}$$

La différence avec la partie d'ordre inférieur ou égal à 1 (vue comme agissant sur r) est donc

$$\bar{g}^{-1} r \bar{g}^{-1} \partial^2 r + \bar{g}^{-1} \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k (r \bar{g}^{-1})^k \partial^2 (\bar{g} + r)$$

et il est clair que cet opérateur vérifie toutes les hypothèses nécessaires pour être qualifié d'opérateur polyhomogène au moins quadratique : pour tout poids δ , il s'écrit bien comme la somme d'une partie polynômiale à coefficients polyhomogènes en le 2-jet de r et d'un terme vivant dans un espace de poids δ en la direction radiale (tronquer la somme et le développement de l'inverse de $\bar{g}$ à un ordre suffisamment élevé). Les autres termes apparaissant dans l'opérateur se traitent évidemment de la même façon.

Proposition 6.2. *Soit $k \geq 2$, $\alpha \in]0, 1[$ et (δ_1, δ_2) vérifiant les conditions du lemme 2.5, et on suppose que le premier poids critique supérieur μ_+ de L est supérieur ou égal à 1. Si $u \in C_{\delta_1, \delta_2}^{k, \alpha}$ est solution de*

$$Lu = \ell(u) + q(u) + f$$

où

- ℓ est un opérateur différentiel linéaire à coefficients polyhomogènes qui appartient à l'algèbre $e^{-s} Q_1$ dans le cas réel, $e^{-s/2} Q_1$ dans le cas complexe ;
 - q est un opérateur polyhomogène au moins quadratique ;
 - et f est une section de $\dot{\mathcal{A}}_{\mu_+ + \eta, \delta_2}$ (pour un $\eta > 0$) modulo $C_{\infty, \delta_2}^{\infty}$,
- alors pour tout $\delta < 1$ dans le cas réel et $\delta < 1/2$ dans le cas complexe et pour tout opérateur différentiel linéaire Q dans l'algèbre Q ,
- $Q(\tilde{\nabla}_H)^k u \in C_{\mu_+ + \delta, \delta_2}^0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ dans le cas réel ;
 - $Q(\tilde{\nabla}_H)^k (\tilde{\nabla}_R)^{k'} u \in C_{\mu_+ + \delta, \delta_2}^0$ pour tous $(k, k') \in \mathbb{N}^2$ dans le cas complexe.

Preuve. — Le raisonnement diverge légèrement selon le caractère réel ou complexe de l'espace modèle, en raison de l'existence (ou non) d'une anisotropie dans les dérivées transverses. Nous nous contentons ici de la preuve dans le cas complexe, plus délicate, le cas réel s'en déduisant facilement.

On commence par remarquer qu'en vertu du lemme de régularité, une section u vérifiant les hypothèses de l'énoncé est en réalité dans $C_{\mu_+ - \varepsilon, \delta_2}^\infty$ pour tout $\varepsilon > 0$, ce qui justifie de s'intéresser à l'ensemble de ses dérivées. La suite de la preuve procède par récurrence, de manière analogue à ce qui est fait par exemple dans [4] : le principe est de faire une récurrence sur $k + k'$, à l'intérieur de laquelle s'insère une récurrence sur k .

Amorce ($k + k' = 0$). Il suffit de calculer

$$L(\tilde{\nabla}_R u) = [L, \tilde{\nabla}_R]u + \tilde{\nabla}_R(Lu).$$

Comme $[L, \tilde{\nabla}_R] \in \mathcal{Q}$, le premier terme du membre de droite est dans $C_{\mu_+ - \varepsilon, \delta_2}^\infty$ pour tout $\varepsilon > 0$. Le second se décompose en

$$\tilde{\nabla}_R(Lu) = [\tilde{\nabla}_R, \ell]u + \ell(\tilde{\nabla}_R u) + \tilde{\nabla}_R(q(u)) + \tilde{\nabla}_R f;$$

on constate alors que

- (1) comme f est somme d'un terme polyhomogène fini et d'un terme décroissant très rapidement au voisinage de l'infini, $\tilde{\nabla}_R f$ est nécessairement dans $C_{\mu_+ - \varepsilon, \delta_2}^\infty$ (on notera ici qu'une dérivée selon R ou H d'un terme polyhomogène n'entraîne pas de perte de poids—ce fait sera fréquemment utilisé dans la suite);
- (2) $q(u)$ est dans $C_{\mu_+ - \varepsilon + 1, \delta_2}^\infty$ en raison de l'hypothèse sur le développement de Taylor de la fraction rationnelle q (on utilise ici que $\mu_+ \geq 1$);
- (3) $[\tilde{\nabla}_R, \ell]$ est dans $\mathcal{Q}$ en vertu des résultats de la fin de la section précédente, donc $[\tilde{\nabla}_R, \ell]u$ est dans $C_{\mu_+ - \varepsilon, \delta_2}^\infty$;
- (4) $\tilde{\nabla}_R u$ est dans $C_{\mu_+ - 1 - \varepsilon, \delta_2}^\infty$ donc $\ell(\tilde{\nabla}_R u)$ est dans $C_{\mu_+ - 1/2 - \varepsilon, \delta_2}^\infty$.

Autrement dit, $L(\tilde{\nabla}_R u)$ est dans $C_{\mu_+ - \varepsilon - 1/2, \delta_2}^\infty$, d'où l'on déduit par le lemme de régularité que $\tilde{\nabla}_R u \in C_{\mu_+ - \varepsilon - 1/2, \delta_2}^\infty$. Ce résultat peut être immédiatement réintroduit dans le point (4) : $\ell(\tilde{\nabla}_R u)$ est alors dans $C_{\mu_+ - \varepsilon, \delta_2}^\infty$ et le lemme de régularité fournit l'estimation souhaitée :

$$\tilde{\nabla}_R u \in C_{\mu_+ - \varepsilon, \delta_2}^\infty.$$

En ce qui concerne la dérivée selon un vecteur h dans H , on a de nouveau

$$L(\tilde{\nabla}_h u) = [L, \tilde{\nabla}_h]u + \tilde{\nabla}_h(Lu)$$

et le terme le plus à droite est traité comme précédemment (noter qu'une dérivée selon H ne fait perdre qu'un poids égal à $1/2$, ce qui évite l'argument en deux temps utilisé plus haut pour la dérivée selon R). De plus,

$$[L, \tilde{\nabla}_h]u = -2\tilde{\nabla}_{e^{-s/2}Jh}\tilde{\nabla}_{e^{-s/2}R}u + Qu ;$$

la décroissance du premier terme provient donc de l'estimation obtenue quelques lignes plus haut sur $\widetilde{\nabla}_R u$ et toutes ses dérivées, tandis que le second terme ne pose pas de problèmes. En appliquant une fois de plus le lemme de régularité, on obtient que $e^{-s}\widetilde{\nabla}_R u$ et $e^{-s/2}\widetilde{\nabla}_H u$ sont dans $C_{\mu_++\delta,\delta_2}^\infty$ et donc que $Qu \in C_{\mu_++\delta,\delta_2}^\infty$ pour tout opérateur différentiel linéaire Q dans $\mathcal{Q}$. Une relecture attentive du raisonnement que nous venons de tenir montre que δ peut être pris égal à n'importe quel réel plus petit que 1 dans le cas réel et que 1/2 dans le cas complexe.

Récurrence. Donnons nous maintenant deux entiers k, k' avec $k + k' > 0$ et supposons que le résultat souhaité est connu pour tout couple (k_1, k'_1) avec $k_1 + k'_1 < k + k'$ ou avec $k_1 + k'_1 = k + k'$ et $k_1 < k$. Prenons maintenant $k + k' + 1$ champs de vecteurs ξ_i sur le bord à l'infini, égaux ou bien à un élément de H ou à R et notons $K = k + k'$. Comme précédemment

$$\begin{aligned} L(\widetilde{\nabla}_{\xi_1} \cdots \widetilde{\nabla}_{\xi_{K+1}} u) &= [L, \widetilde{\nabla}_{\xi_1} \cdots \widetilde{\nabla}_{\xi_{K+1}}]u + \widetilde{\nabla}_{\xi_1} \cdots \widetilde{\nabla}_{\xi_{K+1}}(Lu) \\ &= \sum_{p=0}^{K+1} \widetilde{\nabla}_{\xi_1} \cdots \widetilde{\nabla}_{\xi_{p-1}} [L, \widetilde{\nabla}_{\xi_p}] \widetilde{\nabla}_{\xi_{p+1}} \cdots \widetilde{\nabla}_{\xi_{K+1}} u \\ &\quad + \widetilde{\nabla}_{\xi_1} \cdots \widetilde{\nabla}_{\xi_{K+1}}(Lu). \end{aligned}$$

Intéressons nous ici au premier terme du second membre : pour tout p ,

(1) si $\xi_p = R$, $[L, \widetilde{\nabla}_{\xi_p}] \in \mathcal{Q}$ et on en conclut que

$$\widetilde{\nabla}_{\xi_1} \cdots \widetilde{\nabla}_{\xi_{p-1}} [L, \widetilde{\nabla}_{\xi_p}] \widetilde{\nabla}_{\xi_{p+1}} \cdots \widetilde{\nabla}_{\xi_{K+1}} u \in C_{\mu_++\delta,\delta_2}^\infty$$

en utilisant conjointement l'hypothèse de récurrence avec $k_1 = k$ et $k'_1 = k'_1 - 1$ et celle avec $k_1 + k'_1 = k + k'$ et $k_1 = k_1 - 1$ (noter ici que les commutateurs entre dérivées transverses et éléments de $\mathcal{Q}$ ne font apparaître modulo $\mathcal{Q}$ que des termes contenant une dérivée de moins selon H et le même nombre global de dérivées transverses, qui sont donc redevables de l'hypothèse de récurrence) ;

(2) si $\xi_p \in H$, le commutateur $[L, \widetilde{\nabla}_{\xi_p}]$ peut faire apparaître modulo $\mathcal{Q}$ un terme en dérivées de R , qui est bien contrôlé d'après l'hypothèse de récurrence avec $k_1 + k'_1 = k + k'$ et $k_1 = k_1 - 1$.

En conclusion, chacun des termes dans la somme est dans $C_{\mu_++\delta,\delta_2}^\infty$, reste à traiter le dernier terme du second membre. Celui se décompose à nouveau en une somme de termes faisant intervenir successivement f , $q(u)$ et $\ell(u)$. Tous ces termes se traitent comme dans l'amorce (noter que l'hypothèse $\mu_+ \geq 1$ joue de nouveau un rôle dans le contrôle du terme en $q(u)$), le terme en $\ell(\widetilde{\nabla}_{\xi_1} \cdots \widetilde{\nabla}_{\xi_{K+1}} u)$ étant une fois encore le plus embarrassant si $\xi_{K+1} = R$. Le lemme de régularité (appliqué éventuellement deux fois comme dans l'amorce) assure alors que $\widetilde{\nabla}_{\xi_1} \cdots \widetilde{\nabla}_{\xi_{K+1}} u$ est dans $C_{\mu_+-\varepsilon,\delta_2}^\infty$, et on en tire immédiatement que toute expression de la forme $Q\widetilde{\nabla}_{\xi_1} \cdots \widetilde{\nabla}_{\xi_K} u$ est dans l'espace $C_{\mu_++\delta,\delta_2}^\infty$ souhaité. $\square$

On notera que, dans la preuve, on aurait pu se contenter de prouver la décroissance transverse pour les seules dérivées dans les directions de H , celles dans les directions de R s'en déduisant par crochet. Cette remarque n'évite pas la nécessité d'estimer au moins une dérivée selon R puisque le commutateur de L et de $\widetilde{\nabla}_H$ en fait apparaître. Nous avons préféré donner la preuve générale ci-dessus car elle n'est en réalité pas plus longue.

7. DÉVELOPPEMENT POLYHOMOGÈNE DES MÉTRIQUES D'EINSTEIN ASYMPTOTIQUEMENT HYPERBOLIQUES

Nous considérons maintenant une métrique d'Einstein lisse g et asymptotiquement hyperbolique sur une demi-boule

$$M = \begin{cases} \{x_1^2 + \dots + x_n^2 < 1, x_1 > 0\} & \text{dans le cas réel,} \\ \{(x_1 + \frac{x_3^2 + \dots + x_n^2}{2})^2 + x_2^2 < 1, x_1 > 0\} & \text{dans le cas complexe,} \end{cases}$$

de terme dominant à l'infini $g_0 = g_0(\gamma)$, avec γ lisse, au sens où

$$g - g_0 \in C_{\beta}^{1,\alpha}$$

où $\alpha \in]0, 1[$ et $\beta > 0$. La valeur de $\beta > 0$ sera toujours la même dans toute la suite, choisie de façon à satisfaire les inégalités du lemme 2.1. Par ailleurs, nous noterons

$$\rho(x) = \begin{cases} \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} & \text{dans le cas réel,} \\ \sqrt{(x_1 + \frac{x_3^2 + \dots + x_n^2}{2})^2 + x_2^2} & \text{dans le cas complexe.} \end{cases}$$

Quitte à restreindre la demi-boule, nous pouvons alors tronquer et recoller g comme précédemment à la métrique hyperbolique modèle (voir de nouveau le début de la section 5), de telle sorte qu'elle s'étende en une métrique de courbure sectionnelle strictement négative sur le demi-espace $\{x_1 > 0\}$ tout entier, d'Einstein sauf sur un demi-anneau $\{x_1 > 0, \frac{1}{2} < \rho(x) < \frac{3}{4}\}$. La section 3 produit alors une métrique conforme (que nous continuerons à noter γ , aucune ambiguïté n'étant à craindre) sur le bord à l'infini de la demi-boule $N = \{x_1 > 0, \rho(x) < \frac{1}{2}\}$.

Dans les coordonnées adaptées à cette nouvelle métrique, on a alors dans la demi-boule

$$g - g_0(\gamma) \in C_{\beta,\beta}^{1,\alpha}.$$

Il est alors connu que l'on peut construire dans cette demi-boule une métrique asymptotiquement hyperbolique *polyhomogène* qui est solution approchée des équations d'Einstein à un ordre élevé et dont le terme dominant est la métrique g_0 . Cette construction remonte à Fefferman et Graham dans le cas réel [7, 10] et est due à Seshadri dans le cas complexe [14], voir aussi [4]. La méthode repose sur la résolution d'équations différentielles et s'applique donc tout aussi bien au cas où la métrique sur le bord γ est la métrique complète obtenue à la suite des constructions de la section 3. Dans ce dernier cas la solution approchée obtenue est polyhomogène dans

les espaces à double poids définis dans la section 5. Plus précisément, en notant $\nu_0 = n - 1$ dans le cas réel et $\nu_0 = m$ dans le cas complexe :

Lemme 7.1. *Il existe une métrique $\bar{\phi}$ sur la demi-boule vérifiant :*

- (1) $\bar{\phi} - g_0 \in \dot{\mathcal{A}}_{1,1}$ dans le cas réel, $\dot{\mathcal{A}}_{1/2,1}$ dans le cas complexe ;
- (2) $\text{Ric}^{\bar{\phi}} + c\bar{\phi} \in \dot{\mathcal{A}}_{\nu,1}$ modulo $C_{\infty,1}^\infty$ pour un certain $\nu > \nu_0$;
- (3) les termes apparaissant dans le développement de $\bar{\phi}$ sont des termes exponentiels d'exposants tous entiers dans le cas réel et demi-entiers dans le cas complexe, sans termes polynômiaux à l'exception d'un éventuel terme en $se^{\nu_0 s}$.

Nous pouvons évidemment prolonger $\bar{\phi}$ sur la boule tout entière en la recollant avec la métrique hyperbolique. D'après la section 4, il est alors possible de trouver un difféomorphisme Φ de la boule induisant l'identité au bord à l'infini de telle sorte que la métrique tirée en arrière, que nous désignerons par $\phi = \Phi^*g$, soit solution de

$$B_{\bar{\phi}}(\phi) = 0,$$

sur la demi-boule $\{x_1 > 0, \rho(x) < \frac{1}{2}\}$. Par le lemme 4.4, on a alors sur la demi-boule

$$\phi - \bar{\phi} \in C_{\beta,\beta}^\infty$$

pour un certain $\beta > 0$. D'autre part, les équations impliquent immédiatement

$$F(\phi) = \text{Ric}^\phi + c\phi + (\delta^\phi)^* B_{\bar{\phi}}(\phi) = 0.$$

avec $c = n - 1$ dans le cas réel et $c = \frac{m+1}{2}$ dans le cas complexe.

Puisque $\phi - \bar{\phi} \in C_{\beta,\beta}^\infty$, par le lemme 6.1, on obtient

$$\phi - \bar{\phi} \in C_{\nu_0 - \varepsilon, \beta}^{k,\alpha}$$

pour tout $\varepsilon > 0$, voir par exemple [4, section 4]. On notera ici que le premier poids critique supérieur μ_+ de l'opérateur obtenu comme la différentielle de F (en n'importe quelle métrique asymptotiquement hyperbolique) n'est autre que le nombre ν_0 introduit plus haut [2], qui est toujours supérieur ou égal à 1.

Le but de cette section est de prouver l'existence d'un développement polyhomogène de ϕ . Pour des raisons techniques, il est commode d'introduire une version précisée de la polyhomogénéité. Nous notons à partir de maintenant L la différentielle de F en g_0 :

Définition 7.2. Un développement L -polyhomogène est un développement polyhomogène de la forme

$$\sum a_{\sigma,\tau} r^\sigma e^{-\tau r}$$

dont toutes les puissances τ sont dans le monoïde (additif) $\mathbb{N}_L$ engendré par les poids critiques supérieurs de L et par 1 dans le cas réel ou par $\frac{1}{2}$ dans le cas complexe.

L'intérêt de cette définition est que la suite des puissances τ qui apparaissent dans un tel développement, une fois ordonnée, tend nécessairement vers l'infini. De manière un peu plus précise, on définit la suite de réels positifs

$$a_0 = 0, \quad \mu_+ + a_{k+1} = \min\{\lambda \in \mathbb{N}_L, \lambda > \mu_+ + a_k\}$$

où μ_+ est le premier poids critique supérieur de $L = dF_{g_0}$ (cf. plus haut). Autrement dit, la suite $(\mu_+ + a_k)$ est exactement la suite des puissances de e^r qui apparaissent dans un développement L -polyhomogène. Par construction, on a donc $\mu_+ + a_k \in \mathbb{N}_L$, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = +\infty$, et $a_{k+1} \leq a_k + 1$ dans le cas réel, resp. $a_{k+1} \leq a_k + \frac{1}{2}$ dans le cas complexe, tous faits utiles pour la suite.

Nous rappelons enfin que nous disposons d'une solution approchée et L -polyhomogène $\bar{\phi}$, telle que $\bar{\phi} - g_0 \in \dot{\mathcal{A}}_{1,\beta}$ dans le cas réel, $\bar{\phi} - g_0 \in \dot{\mathcal{A}}_{1/2,\beta}$ dans le cas complexe et

$$F(\bar{\phi}) \in \mathcal{A}_{\nu,\beta} \text{ mod. } C_{\infty,\beta}^\infty,$$

où $\nu > \mu_+ = \mu_+ + a_0$. Le principal résultat technique de cet article est alors le suivant :

Théorème 7.3. *Si $\bar{\phi}$ satisfait toutes les hypothèses précédentes, il existe une suite (ϕ_k) de solutions approchées L -polyhomogènes telle que*

- (1) $\phi_k = \bar{\phi} + \psi_0 + \dots + \psi_k$, avec $\psi_k \in \dot{\mathcal{A}}[\mu_+ + a_k]_\beta$ pour tout $k \in \mathbb{N}$;
- (2) pour tout $k \in \mathbb{N}$, $F(\phi_k) \in \dot{\mathcal{A}}_{\mu_+ + a_{k+1},\beta}$ modulo $C_{\infty,\beta}^\infty$;
- (3) en notant $r_k = \bar{\phi} - \phi_k$, pour tous k et p dans $\mathbb{N}$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$(\widetilde{\nabla}^{\text{trans}})^p r_k \in C_{\mu_+ + a_k + \delta, \beta}^0$$

où $\widetilde{\nabla}^{\text{trans}}$ désigne toute dérivée dans une direction du bord à l'infini.

Ce résultat entraîne immédiatement le suivant, qui constitue la version quantitative de notre théorème 1 de l'introduction.

Théorème 7.4. *Soit une demi-boule*

$$M = \begin{cases} \{x_1^2 + \dots + x_n^2 < 1, x_1 > 0\} & \text{dans le cas réel,} \\ \{x_1^2 + x_2^2 + (\frac{x_3^2 + \dots + x_n^2}{2})^2 < 1, x_1 > 0\} & \text{dans le cas complexe,} \end{cases}$$

et γ une métrique lisse sur $\partial_\infty M = \{x_1 = 0\} \cap \bar{M}$, resp. η une structure de contact lisse et J une structure presque complexe lisse dans $H = \text{Ker } \eta$ sur $\partial_\infty M$ telles que $\gamma = d\eta(\cdot, J\cdot)$ soit définie positive.

Si g est une métrique d'Einstein asymptotiquement hyperbolique réelle, resp. complexe, au sens où $g - g_0(\gamma) \in C_\varepsilon^{1,\alpha}$ pour $\alpha \in]0, 1[$ et $\varepsilon > 0$, alors il existe une demi-boule N incluse dans M , un difféomorphisme Φ de $\bar{N}$ induisant l'identité sur $\partial N \cup \partial_\infty N$, une suite de métriques asymptotiquement hyperboliques g_k sur N , à développement polyhomogène fini, et un couple (δ, η) de réels strictement positifs tels que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \Phi^* g - g_k \in C_{\mu_+ + a_k + \delta, \eta}^\infty(N).$$

De plus, la même estimation est valable pour toutes les dérivées transverses.

Preuve du théorème 7.3. – L'existence de la suite (ϕ_k) se démontre une nouvelle fois par récurrence. Profitons en pour rappeler que la convention énoncée au début de la section 6 est toujours en vigueur.

7.1. Amorce. Elle est immédiate car on commence la récurrence en $k = -1$ en ajoutant aux définitions de l'énoncé $\phi_{-1} = \bar{\phi}$ (soit $\psi_{-1} = 0$) et $a_{-1} = -1$. Le seul point à démontrer est l'estimation (3) sur les dérivées transverses du reste, qui est une conséquence des résultats de la section précédente. De fait, un développement au premier ordre de l'opérateur F au point g_0 donne

$$0 = F(\phi) = F(\bar{\phi}) + dF_{\bar{\phi}}(r_{-1}) + q_{-1}(r_{-1}).$$

Or

- (1) $F(\bar{\phi}) \in \mathcal{A}_{\mu_+ + a_0 + \delta, \beta}$ (pour un certain $\delta > 0$) modulo $C_{\infty, \beta}^\infty$, par construction ;
- (2) $dF_{\bar{\phi}} = L + (dF_{\bar{\phi}} - L)$, où $\ell_{-1} := dF_{\bar{\phi}} - L$ est un opérateur différentiel linéaire à coefficients polyhomogènes et qui appartient à $e^{-s}Q_1$ dans le cas réel ou $e^{-s/2}Q$ dans le cas complexe ;
- (3) le reste q_{-1} est un opérateur polyhomogène au moins quadratique au sens de la section précédente.

On peut alors écrire

$$L(r_{-1}) = -F(\bar{\phi}) - \ell_{-1}(r_{-1}) - q_{-1}(r_{-1})$$

et l'opérateur L est redevable du résultat du lemme 5.3 avec nos choix de métriques car $\tilde{A} + \mathcal{R}_0$ est positif, voir par exemple [2]. Les résultats de la section 6 fournissent alors l'existence d'un $\delta > 0$ tel que

$$Q(\tilde{\nabla}^{\text{trans}})^p r_{-1} \in C_{\mu_+ + \delta, \beta}^0$$

pour tout $p \in \mathbb{N}$ et tout Q dans $\mathcal{Q}$.

7.2. Récurrence. Supposons maintenant les ϕ_j construits pour $-1 \leq j \leq k$ de telle sorte qu'ils vérifient les propriétés (1–3) du théorème 7.3. Le calculé, que nous avons déjà utilisé, est le suivant :

$$\begin{aligned} 0 &= F(\phi) = F(\phi_k) + dF_{\phi_k}(r_k) + q_k(r_k) \\ &= F(\phi_k) + L(r_k) + (dF_{\phi_k} - L)(r_k) + q_k(r_k) \end{aligned}$$

où q_k est l'opérateur obtenu à partir de F en lui ôtant son linéarisé en ϕ_k et L est, comme précédemment, l'opérateur linéarisé en g_0 , terme dominant de ϕ_k . Il s'agit donc d'un opérateur polyhomogène au moins quadratique au sens de la section précédente. Ceci conduit à

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(r_k) &= -[F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}} - (F(\phi_k) - [F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}}) \\ &\quad - L^{\text{trans}}(r_k) - (dF_{\phi_k} - L)(r_k) - q_k(r_k). \end{aligned}$$

Cette équation s'écrit de manière condensée sous la forme

$$\mathcal{I}(r_k) = -[F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}} - e_{k+1}$$

où l'on a regroupé tous les termes du membre de droite sauf le premier dans e_{k+1} . En utilisant les différentes hypothèses de la récurrence et le fait que $\mu_+ \geq 1$, on voit de plus aisément que

$$e_{k+1} \in C_{\mu_+ + a_{k+1} + \varepsilon, \beta}^0$$

pour un $\varepsilon > 0$: l'assertion (3) de l'hypothèse de récurrence et $L^{\text{trans}} \in \mathcal{Q}_0$ permettent de traiter le terme en L^{trans} , les autres estimations sont immédiates ; remarquer néanmoins une fois encore qu'on utilise $\mu_+ \geq 1$ (hypothèse dont nous avons déjà noté qu'elle est heureusement vérifiée dans les deux situations qui nous intéressent). Pour définir ψ_{k+1} , il nous faut maintenant considérer différents cas suivant la position de $\mu_+ + a_k$ et $\mu_+ + a_{k+1}$ par rapport aux poids critiques supérieurs.

Cas 1 : $\mu_+ + a_k \geq \mu_+^{\text{max}}$. On a donc $\mu_+ + a_k + \delta > \mu_+^{\text{max}}$ et le fait que r_k soit dans $C_{\mu_+ + a_k + \delta, \beta}^0$ pour un $\delta > 0$ entraîne immédiatement que

$$r_k = G_\infty([F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}}) + G_\infty(e_{k+1}).$$

On pose alors

$$\psi_{k+1} = G_\infty([F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}}) \in \dot{\mathcal{A}}[\mu_+ + a_{k+1}]_\beta$$

où nous avons noté ici G_∞ l'opérateur qui est égal sur chaque espace propre de $\tilde{A} + \mathcal{R}_0$ à l'opérateur scalaire G_∞ défini plus haut avec le couple de poids $(\mu_-^{(i)}, \mu_+^{(i)})$ correspondant à l'espace propre considéré.

Comme $\mu_+ + a_{k+1} > \mu_+^{\text{max}}$, tout échange entre dérivations transverses et intégrales entre r et $+\infty$ est licite (convergence dominée évidente) donc ψ_{k+1} est polyhomogène à coefficients lisses et les coefficients vivent dans l'espace de poids β sur les tranches. On définit alors $\phi_{k+1} = \phi_k + \psi_{k+1}$, et le reste des notations à l'avenant. L'assertion (2) provient alors d'un développement de Taylor à l'ordre 1 de $F(\phi_{k+1})$, analogue à celui fait plus haut :

$$\begin{aligned} F(\phi_{k+1}) &= F(\phi_k + \psi_{k+1}) \\ &= F(\phi_k) + (dF_{\phi_k})(\psi_{k+1}) + q_k(\psi_{k+1}) \\ &= F(\phi_k) + L(\psi_{k+1}) + (dF_{\phi_k} - L)(\psi_{k+1}) + q_k(\psi_{k+1}), \end{aligned}$$

où q_k est l'opérateur (polyhomogène au moins quadratique au sens de la section précédente) obtenu en ôtant à F sa valeur et son linéarisé en ϕ_k . Ainsi,

$$\begin{aligned} F(\phi_{k+1}) &= [F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}} + \mathcal{I}(\psi_{k+1}) \\ &\quad + F(\phi_k) - [F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}} \\ &\quad + L^{\text{trans}}(\psi_{k+1}) + (dF_{\phi_k} - L)(\psi_{k+1}) + q_k(\psi_{k+1}). \end{aligned}$$

Dès lors,

- (1) la première ligne dans le membre de droite est nulle par construction de ψ_{k+1} ;

- (2) comme $F(\phi_k)$ est L -polyhomogène, le terme apparaissant à la deuxième ligne est dans $\dot{\mathcal{A}}_{\mu_+ + a_{k+2}, \beta}$: en effet, l'opérateur F est

$$\phi \mapsto \text{Ric}^\phi + c\phi + (\delta^\phi)^* B_{\bar{\phi}}(\phi)$$

et le calcul explicite de $F(\phi_k)$ (expression déjà étudiée précédemment) fait intervenir des dérivées radiales du terme polyhomogène ϕ_k (qui conservent les poids), des dérivées transverses (qui produisent un gain d'un poids dans le cas réel ou d'un demi-poids dans le cas complexe), et des produits de ces mêmes termes, le tout modulo $C_{\infty, \beta}^\infty$. Au final, il apparaît un terme dominant, nécessairement de poids $\mu_+ + a_{k+1}$ par hypothèse de récurrence, et des termes complémentaires dont les poids sont obtenus par des sommes finies des différents $\mu_+ + a_i$ pour $i \leq k$ et d'entiers dans le cas réel, resp. de demi-entiers dans le cas complexe. Par définition de la suite a_k , tous ces poids sont supérieurs ou égaux au plus petit élément du monoïde strictement supérieur à $\mu_+ + a_{k+1}$ soit $\mu_+ + a_{k+2}$;

- (3) enfin, ψ_{k+1} étant L -polyhomogène et dans $\dot{\mathcal{A}}[\mu_+ + a_{k+1}]_\beta$, tous les autres termes sont dans $\dot{\mathcal{A}}_{\mu_+ + a_{k+1} + 1}$ dans le cas réel et $\dot{\mathcal{A}}_{\mu_+ + a_{k+1} + 1/2}$ dans le cas complexe car $dF_{\phi_k} - L$ est dans $e^{-s}Q_1$ dans le cas réel ou $e^{-s/2}Q_1$ dans le cas complexe, q_k préserve les poids et $\mu_+ \geq 1$.

Dans tous les cas,

$$F(\phi_{k+1}) \in \dot{\mathcal{A}}_{\mu_+ + a_{k+2}, \beta} \text{ mod. } C_{\infty, \beta}^\infty.$$

Démontrons enfin l'assertion (3), en étudiant d'un peu plus près

$$e_{k+1} = (F(\phi_k) - [F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}}) + L^{\text{trans}}(r_k) + (dF_{\phi_k} - L)(r_k) + q_k(r_k).$$

On constate alors que

- (1) par L -polyhomogénéité, toutes les $\tilde{\nabla}^{\text{trans}}$ -dérivées du premier terme de e_{k+1} sont dans $\dot{\mathcal{A}}_{\mu_+ + a_{k+2}, \beta}$ modulo $C_{\infty, \beta}^\infty$;
- (2) par hypothèse de récurrence sur r_k , plus précisément l'assertion (3), toutes celles du deuxième terme sont dans $C_{\mu_+ + a_k + 1 + \eta, \beta}^0$ dans le cas réel, resp. $C_{\mu_+ + a_k + 1/2 + \varepsilon, \beta}^0$ dans le cas complexe, pour un certain $\varepsilon > 0$ (se souvenir que L^{trans} est dans Q_0 d'où le gain d'un poids, resp. demi-poids... —éventuellement avec une correction $-\eta$ à cause de la possible apparition de termes polynômiaux) ;
- (3) l'assertion (3) sur r_k entraîne que toutes les dérivées transverses de $(dF_{\phi_k} - L)(r_k)$ sont dans le même espace $C_{\mu_+ + a_k + 1 + \varepsilon, \beta}^0$ dans le cas réel ou $C_{\mu_+ + a_k + 1/2 + \varepsilon, \beta}^0$ dans le cas complexe car $dF_{\phi_k} - L$ est à coefficients polyhomogènes et vit donc dans $e^{-s}Q_1$ ou $e^{-s/2}Q_1$, d'où de même un gain de presque un ou un demi poids ;
- (4) enfin, les dérivées transverses de $q_k(r_k, r_k)$ sont toujours dans ce même espace en utilisant encore une fois l'assertion (3) pour r_k , les hypothèses sur q_k et que $\mu_+ \geq 1$.

On en conclut donc que $(\tilde{\nabla}^{\text{trans}})^p e_{k+1} \in C_{\mu_+ + a_{k+1} + \delta, \beta}^0$, pour un $\delta > 0$. En particulier, G_∞ commute aux dérivées transverses car $\mu_+ + a_{k+1} + \delta$ est strictement supérieur à μ_+^{max} . Se souvenant que $r_{k+1} = G_\infty(e_{k+1})$ ici, on a

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad (\tilde{\nabla}^{\text{trans}})^p r_{k+1} \in C_{\mu_+ + a_{k+1} + \delta, \beta}^0,$$

ce qui est le résultat voulu.

Cas 2 : $\mu_+ + a_k < \mu_+^{\text{max}}$. Ce cas ne se rencontre qu'un nombre fini de fois puisque les poids critiques supérieurs sont en nombre fini et que la suite (a_k) tend vers l'infini par construction (c'est ici que la L -polyhomogénéité et l'ensemble $\mathbb{N}_L$ jouent un rôle commode). Il se divise de plus en deux sous-cas suivant que $[\mu_+ + a_k + \delta, \mu_+ + a_{k+1}]$ contient ou non un poids critique (supérieur).

Sous-cas 2.1 : $[\mu_+ + a_k + \delta, \mu_+ + a_{k+1}]$ ne contient pas de $\mu_+^{(i)}$. On a alors

$$r_k = G([F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}}) + G(e_{k+1}) + A(s)$$

où, sur le i -ème espace propre de $A + \mathcal{R}_0$,

$$G = \begin{cases} G_0 & \text{si } \mu_+ + a_{k+1} < \mu_+^{(i)} \\ G_\infty & \text{sinon} \end{cases}$$

ces deux opérateurs étant définis avec le couple de poids $(\mu_-^{(i)}, \mu_+^{(i)})$ correspondant à l'espace propre, et le terme $A(s)$ est une somme finie de la forme

$$\sum_i A_i e^{-\mu_+^{(i)} s}$$

où les A_i sont des sections sur le bord à l'infini et i parcourt seulement les espaces propres tels que $\mu_+ + a_{k+1} < \mu_+^{(i)}$. On peut alors définir

$$\psi_{k+1} = G([F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}}) \in \dot{\mathcal{A}}[\mu_+ + a_{k+1}]_\beta,$$

puis ϕ_{k+1} , r_{k+1} , etc. comme précédemment.

Vérifions d'abord que $F(\phi_{k+1})$ est dans $\dot{\mathcal{A}}_{\mu_+ + a_{k+2}, \beta}$ comme souhaité. On commence par remarquer que ψ_{k+1} est une somme de termes de deux types :

- des intégrales entre r et $+\infty$ là où $\mu_+ + a_{k+1} > \mu_+^{(i)}$, donc où tous les échanges entre intégrales et dérivations transverses sont licites ;
- des intégrales sur le segment $[r_0, r]$ où ces mêmes dérivations ne posent évidemment pas de problèmes.

On écrit alors de nouveau

$$\begin{aligned} F(\phi_{k+1}) &= [F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}} + \mathcal{I}(\psi_{k+1}) \\ &\quad + F(\phi_k) - [F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}} \\ &\quad + L^{\text{trans}}(\psi_{k+1}) + (dF_{\phi_k} - L)(\psi_{k+1}) + q_k(\psi_{k+1}) \end{aligned}$$

et on constate que les mêmes arguments que ceux décrits dans le cas 1 fournissent que

$$F(\phi_{k+1}) \in \dot{\mathcal{A}}_{\mu_+ + a_{k+2}, \beta}.$$

Une étude plus poussée du terme $A(s)$ est nécessaire pour démontrer l'assertion (3). Il s'agit d'un élément du noyau de l'opérateur indicial, qui ne

possède pour l'instant aucune régularité particulière en les directions transverses, et la décroissance de ses éventuelles dérivées transverses (si elles existent) n'est pas contrôlée. La méthode permettant d'obtenir cette régularité est identique dans les deux sous-cas 2.1 et 2.2 ; elle entraîne immédiatement, comme nous le verrons, que l'assertion (3) de l'hypothèse de récurrence est vérifiée au cran $k + 1$. Nous repoussons donc au paragraphe 7.3 ci-dessous la preuve de ces faits et nous nous intéressons d'abord au second sous-cas.

Sous-cas 2.2 : $[\mu_+ + a_k + \delta, \mu_+ + a_{k+1}]$ contient un poids critique supérieur, qui est nécessairement égal à $\mu_+ + a_{k+1}$ par définition de la suite (a_k) . On peut alors écrire comme précédemment

$$r_k = G([F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}}) + G(e_{k+1}) + A_0 e^{-(\mu_+ + a_{k+1})s} + A(s)$$

où A_0 est une section sur le bord à l'infini (pour l'instant sans régularité) : comme précédemment, on a sur le i -ème espace propre de $A + \mathcal{R}_0$

$$G = \begin{cases} G_0 & \text{si } \mu_+ + k + \varepsilon \leq \mu_+^{(i)} \\ G_\infty & \text{sinon} \end{cases}$$

et le terme $A(s)$ est défini comme dans le sous-cas 2.1. On pose alors

$$\psi_{k+1} = G([F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}}) + A_0 e^{-(\mu_+ + a_{k+1})s}$$

(attention, ici le premier des deux termes de droite peut être nul), etc. L'étape suivante est d'obtenir la régularité transverse de A_0 et des termes intervenant dans $A(s)$. Comme dans le sous-cas précédent, nous repoussons cette preuve au paragraphe 7.3 ci-dessous ; l'assertion (3) s'en déduira immédiatement. Une fois cette étape réalisée, nous pouvons vérifier que $F(\phi_{k+1})$ est dans $\mathcal{A}_{\mu_+ + k + 2, \beta}$, ce qui s'obtient en reprenant mot pour mot les raisonnements déjà tenus dans le cas 1 et le sous-cas 2.1. On notera néanmoins que des dérivées de ψ_{k+1} interviennent dans les arguments menant à la décroissance de $F(\phi_{k+1})$; comme le terme en $A_0 e^{-(\mu_+ + a_{k+1})s}$ est partie prenante de ψ_{k+1} , il est impératif d'avoir obtenu la régularité transverse auparavant pour conclure.

7.3. Régularité transverse et assertion (3) dans les sous-cas 2.1 et 2.2.

Comme plus haut, nous décomposons r_{k+1} et ψ_{k+1} sur les espaces propres de $\tilde{A} + \mathcal{R}_0$, de poids critiques associés $(\mu_-^{(i)}, \mu_+^{(i)})$. Les composantes d'une section u seront alors notées $u^{(i)}$.

Sur les espaces propres où $\mu_+ + a_k \geq \mu_+^{(i)}$,

$$\psi_{k+1}^{(i)} = G_\infty ([F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}}^{(i)})$$

est donc polyhomogène à coefficients lisses,

$$r_{k+1}^{(i)} = G_\infty (e_{k+1}^{(i)})$$

et la régularité transverse et les contrôles des dérivées transverses sont donc obtenus comme dans le cas 1.

Sur les espaces propres où $\mu_+ + a_{k+1} < \mu_+^{(i)}$,

$$\psi_{k+1}^{(i)} = G_0 \left([F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}}^{(i)} \right)$$

est polyhomogène à coefficients lisses (l'intégrale potentiellement problématique est une fois encore une intégrale sur un segment). De plus,

$$r_{k+1}^{(i)} = r_k^{(i)} - \psi_{k+1}^{(i)} = G_0(e_{k+1}^{(i)}) + A_i e^{-\mu_+^{(i)} s}$$

où A_i est un terme ne dépendant que des variables transverses et qui est pour l'instant sans régularité particulière. Considérons cependant cette expression sur la tranche $s = s_0$: $r_k^{(i)}$ est lisse en les variables transverses par hypothèse de récurrence, $\psi_{k+1}^{(i)}$ l'est aussi comme on vient de le remarquer, le terme en $e^{-\mu_+^{(i)} s}$ dans $G_0(e_{k+1}^{(i)})$ l'est également, et le second terme intégral est nul puisque $s = s_0$. Donc A_i est nécessairement lisse en les directions transverses (un contrôle de la décroissance des dérivées transverses sera obtenu un peu plus loin).

Il nous reste enfin à étudier dans le sous-cas 2.2 l'espace propre dont le poids critique supérieur est égal à $\mu_+ + a_{k+1}$. Nous notons ce poids critique $\mu_+^{(0)}$ par facilité, l'espace propre correspondant étant associé à l'indice $i = 0$. On a alors

$$r_{k+1}^{(0)} = G_0(e_{k+1}^{(0)})$$

et ce terme est donc lisse en les directions transverses (une fois encore, l'intégrale potentiellement problématique est sur un segment). De plus,

$$\psi_{k+1}^{(0)} = r_{k+1}^{(0)} - r_k^{(0)} = G_0 \left([F(\phi_k)]_{\mu_+ + a_{k+1}}^{(0)} \right) + A_0 e^{-\mu_+^{(0)} s}$$

et on obtient la régularité de A_0 comme dans le cas précédent en fixant $s = s_0$, car $r_k^{(0)}$ est là encore lisse en les directions transverses par hypothèse de récurrence.

Démontrons maintenant les estimées attendues sur les dérivées transverses des $r_{k+1}^{(i)}$ dans les deux derniers cas. Elles sont immédiates pour les termes en les A_i puisqu'ils sont polyhomogènes, vivent dans $\dot{\mathcal{A}}_{\mu_+^{(i)} \beta}$ avec $\mu_+^{(i)} > \mu_+ + a_{k+1}$, et sont lisses en les directions transverses : toute dérivée transverse est donc de même poids. Il ne reste donc qu'à estimer les dérivées transverses

$$(\widetilde{\nabla}^{\text{trans}})^p G_0(e_{k+1}^{(i)}) = G_0 \left((\widetilde{\nabla}^{\text{trans}})^p e_{k+1}^{(i)} \right),$$

où i est éventuellement égal à 0. L'échange des dérivées et des intégrales étant autorisé puisque le terme potentiellement problématique est en réalité une fois encore une intégrale sur un segment, les estimations s'obtiennent alors en remarquant que pour toute fonction f de l'espace à simple poids C_α^0 ,

$$\left| e^{-\theta s} \int_{+\infty}^s e^{\theta \varsigma} f d\varsigma \right| \leq C e^{-\alpha s}$$

si $\theta \neq \alpha$, et

$$\left| e^{-\alpha s} \int_{s_0}^s e^{\alpha \varsigma} f d\varsigma \right| \leq C s e^{\alpha s}.$$

8. CONTINUATION UNIQUE DANS LE CAS COMPLEXE

La démonstration de la continuation unique est analogue à celle dans le cas réel [3], donc nous ne donnerons pas tous les détails. Il y a trois ingrédients :

- (1) l'existence d'une « équation spéciale » du bord, qui permet de mettre les métriques dans une jauge géodésique ;
- (2) la coïncidence à un ordre infini des deux métriques g_1 et g_2 dans la jauge géodésique, qui résulte de la polyhomogénéité et du calcul des poids critiques supérieurs de la linéarisation L ;
- (3) la coïncidence de g_1 et g_2 grâce aux estimations de Carleman, utilisées via la méthode de [3].

Commençons donc par (1). Une équation spéciale du bord est une fonction ν , s'annulant au bord $\{u = 0\}$, telle que $|d\nu|_{\nu^2 g} = 1$, ce qui s'écrit encore $|\frac{d\nu}{\nu}|_g = 1$. On cherche ν sous la forme $\nu = e^{2\phi}u$, d'où vient l'équation

$$(68) \quad \left\langle \frac{d\phi}{\sqrt{u}}, \frac{du}{u} \right\rangle_g + \frac{|d\phi|_g^2}{\sqrt{u}} = \frac{1}{4\sqrt{u}} \left(1 - \left| \frac{du}{u} \right|_g^2 \right), \quad \phi|_{u=0} = 0.$$

Compte tenu du contrôle de la métrique obtenu au lemme 3.4, le second membre est borné, en réalité $O(\nu)$. D'un autre côté, le membre de gauche est une équation aux dérivées partielles d'ordre 1 sur ϕ , se réduisant à $\frac{\partial \phi}{\partial \sqrt{u}}$ sur le bord, donc l'hypersurface $\sqrt{u} = 0$ n'est pas caractéristique. (Le lecteur aura remarqué que pour résoudre l'équation, il faut considérer $\sqrt{u}$ plutôt que u comme équation lisse du bord). Compte tenu de la forme de la métrique, aucune singularité ne provient du bord $\{v = 0\}$, et on déduit qu'existe, au voisinage du bord, une unique solution ϕ de l'équation (68), satisfaisant

$$\phi = O(\sqrt{u}\nu).$$

(On peut borner aussi les dérivées de ϕ).

En utilisant les niveaux de la nouvelle fonction ν , la métrique est exprimée sous la forme

$$(69) \quad g = \frac{d\nu^2}{\nu^2} + g_\nu,$$

où g_ν est une famille de métriques sur le bord à l'infini, satisfaisant les mêmes conditions asymptotiques que dans le lemme 3.4. En outre, la seconde forme fondamentale $\mathbb{I}$ des tranches $\{\nu = \text{cst.}\}$ est uniformément bornée, ainsi que ses dérivées, et a asymptotiquement pour valeurs propres 1 et $\frac{1}{4}$:

$$(70) \quad |\nabla^k \mathbb{I}| \leq c_k, \quad \mathbb{I} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \frac{1}{4} & \\ & & \ddots \end{pmatrix}.$$

Enfin, si deux métriques g_1 et g_2 coïncident à l'ordre $o(e^{-(m+1)r}) = o(x^{m+1})$, alors après mise en jauge géodésique il est clair que la coïncidence persiste,

avec

$$|g_1 - g_2| = o((\nu\nu^2)^{m+1}).$$

Passons à (2). L'existence d'un développement polyhomogène de la métrique dans une jauge de Bianchi a pour conséquence que la métrique garde un développement polyhomogène dans la jauge géodésique obtenue grâce à une équation spéciale. En outre, les poids critiques pour ce développement sont nécessairement inclus dans ceux du développement en jauge de Bianchi, c'est-à-dire sont des poids critiques supérieurs de la linéarisation L . Un calcul facile basé sur les formules de théorie des représentations de [2] donne les valeurs m , $\frac{1}{2}(m + \sqrt{m^2 + 8})$, $\frac{1}{2}(m + \sqrt{m^2 + 2m + 5})$ et $m + 1$, donc le plus grand poids critique est $m + 1$. La coïncidence jusqu'à l'ordre $o(\nu^{m+1})$ implique donc la coïncidence jusqu'à l'ordre infini : $O(\nu^\infty)$. (Une autre possibilité pour comprendre les poids critiques en jauge géodésique consiste à utiliser le calcul par Seshadri [14, §4] de l'équation d'Einstein en jauge géodésique).

Enfin, examinons la dernière étape (3) : une fois qu'on a la coïncidence à un ordre infini en jauge géodésique, et les estimations de Carleman, la démonstration de [3] s'applique verbatim, et nous ne la répéterons pas. Le dernier pré-requis pour la preuve est donc l'estimation de Carleman : si Δ est un opérateur elliptique géométrique du second ordre, agissant sur les sections d'un fibré, de type $\nabla^*\nabla$ +termes d'ordre inférieur bornés, alors il existe ν_0 et C tel que, pour toute section f à support compact dans $\{0 < \nu < \nu_0\}$, qui est $O(\nu)$ ainsi que ses dérivées, et pour tout $\lambda \gg 0$, on ait

$$(71) \quad \int_{0 < \nu < \nu_0} |\Delta f|^2 \nu^{-\lambda} \text{vol}_g \geq C \int_{0 < \nu < \nu_0} (\lambda^3 |f|^2 + \lambda |\nabla f|^2 + \lambda^{-1} |\nabla^2 f|^2) \nu^{-\lambda} \text{vol}_g.$$

L'estimation de Carleman dans ce contexte est connue depuis longtemps, on en trouvera une démonstration sous les hypothèses géométriques (69) et (70) dans l'article [15]. La différence ici est que les tranches $\{\nu = \text{cst}\}$ sont non compactes, mais comme elles sont complètes cela n'empêche pas les intégrations par parties, possibles vu l'hypothèse sur f quand $\nu \rightarrow 0$.

RÉFÉRENCES

- [1] M. ANDERSON – « Geometric aspects of the AdS/CFT correspondence », *AdS/CFT correspondence : Einstein metrics and their conformal boundaries* (O. Biquard, éd.), IRMA Lectures in Mathematics and Theoretical Physics, vol. 8, European Mathematical Society, 2005, p. 1–31.
- [2] O. BIQUARD – « Métriques d'Einstein asymptotiquement symétriques », *Astérisque* **265** (2000), p. vi+109, English translation : SMF/AMS Texts and Monographs 13 (2006).
- [3] ———, « Continuation unique à partir de l'infini conforme pour les métriques d'Einstein », *Math. Res. Lett.* **15** (2008), no. 6, p. 1091–1099.
- [4] O. BIQUARD et M. HERZLICH – « A Burns-Epstein invariant for ACHE 4-manifolds », *Duke Math. J.* **136** (2005), no. 1, p. 53–100.

- [5] O. Biquard et R. Mazzeo – « A nonlinear Poisson transform for Einstein metrics on product spaces », arXiv :math/0701868.
- [6] P. T. Chruściel, E. Delay, J. M. Lee et D. N. Skinner – « Boundary regularity of conformally compact Einstein metrics », *J. Differential Geom.* **69** (2005), no. 1, p. 111–136.
- [7] C. Fefferman et C. R. Graham – « Conformal invariants », *Astérisque* (1985), no. hors série, p. 95–116, The mathematical heritage of Élie Cartan (Lyon, 1984).
- [8] C. L. Fefferman et C. R. Graham – « The ambient metric », arXiv :0710/0919.
- [9] W. M. Goldman – *Complex hyperbolic geometry*, Oxford Mathematical Monographs, The Clarendon Press Oxford University Press, New York, 1999, Oxford Science Publications.
- [10] C. R. Graham – « Volume and area renormalizations for conformally compact Einstein metrics », *The Proceedings of the 19th Winter School “Geometry and Physics” (Srní, 1999)*, Rend. Circ. Mat. Palermo (2) Suppl., no. 63, 2000, p. 31–42.
- [11] C. R. Graham et J. M. Lee – « Einstein metrics with prescribed conformal infinity on the ball », *Adv. Math.* **87** (1991), no. 2, p. 186–225.
- [12] D. W. Helliwell – « Boundary regularity for conformally compact Einstein metrics in even dimensions », *Comm. Partial Differential Equations* **33** (2008), no. 4-6, p. 842–880.
- [13] J. M. Lee et R. Melrose – « Boundary behaviour of the complex Monge-Ampère equation », *Acta Math.* **148** (1982), p. 159–192.
- [14] N. Seshadri – « Approximately Einstein ACH metrics, volume renormalization, and an invariant for contact manifolds », *Bull. Soc. Math. France* **137** (2009), no. 1, p. 63–91.
- [15] A. Vasy et J. Wunsch – « Absence of super-exponentially decaying eigenfunctions of Riemannian manifolds with pinched negative curvature », *Math. Res. Lett.* **12** (2005), no. 5-6, p. 673–684.

UPMC UNIVERSITÉ PARIS 6, UMR 7586 CNRS, INSTITUT DE MATHÉMATIQUES DE JUSSIEU

UNIVERSITÉ MONTPELLIER 2, UMR 5149 CNRS, INSTITUT DE MATHÉMATIQUES ET DE MODÉLISATION DE MONTPELLIER